

(—5), 长 1—2 厘米, 无毛; 小伞形花序有花 5—23, 花柄不等长; 无萼齿; 花瓣白色、绿白色或略带粉红色, 卵圆形, 长约 0.8 毫米, 宽 0.6 毫米, 顶端内折, 有中脉 1 条; 花丝短于花瓣, 很少与花瓣同长, 花药近圆形, 长约 0.1 毫米; 花柱基扁压, 花柱极短。果实圆心脏形或圆卵形, 长、宽约 1.5—2 毫米, 分生果的棱 5 条, 圆钝; 胚乳腹面平直, 每棱槽内有油管 1, 合生面油管 2。心皮柄顶端 2 浅裂。花期 5 月, 果期 6—7 月。

产江苏、福建、台湾、广东等省。生于杂草地及水沟边, 为外来种。分布于美洲、大洋洲、日本、马来西亚和印度尼西亚的爪哇。

35. 欧芹属——*Petroselinum* Hill

Hill Brit. Herb. 424. 1756.

二年生草本, 很少一年生。叶 2—3 回羽状分裂。花黄绿色或白色; 萼齿不显; 花瓣黄绿色或白色带红晕, 近基部心形, 顶端凹入, 凹处有内折小舌片; 花柱基短圆锥形, 花柱有头状柱头。果实卵形, 侧面稍扁压, 近基部圆形或不明显的心形, 合生面稍收缩或呈现双球形; 分生果有线形果棱 5; 每棱槽内油管 1, 合生面油管 2; 胚乳腹面平直。

约 3 种, 原产欧洲西部和南部, 其中 1 种栽培或成野生状态, 分布于世界各地。

本属模式种: 欧芹 *Apium petroselinum* L. = *Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

1. 欧芹

Petroselinum crispum (Mill.) Hill, Hand-List Herb. Pl. Kew. ed. 3. 122. 1925; Nasir et Ali, Fl. West Pakistan 20: 35. 1972. — *Apium crispum* Mill. Gard. Dict. ed. 8. 2. 1768. — *Apium petroselinum* L. Sp. Pl. 264. 1753. — *Petroselinum hortense* Hoffm. Gen. Pl. Umbell. ed. 2. 163. 1816, nom. nud. — *Petroselinum hortense* Hoffm. var. *crispum* Bailey, Man. Cult. Pl. 564. 1924; Wolff in Engl. Pflanzenr. 90 (IV. 228): 63. 1927.

二年生草本, 光滑。根纺锤形, 有时粗厚。茎圆形, 稍有棱槽, 高 30—100 厘米, 中部以上分枝, 枝对生或轮生, 通常超过中央伞形花序。叶深绿色, 表面光亮, 基生叶和茎下部叶有长柄, 2—3 回羽状分裂, 末回裂片倒卵形, 基部楔形, 3 裂或深齿裂; 齿圆钝有白色小尖头; 上部叶 3 裂, 裂片披针状线形, 全缘或 3 裂。伞形花序有伞辐 10—20 (30), 近等长, 约 2.5 厘米, 光滑; 总苞片 1—2, 线形, 尖锐, 革质; 小伞花序有花 20, 小总苞片 6—8, 线形或线状钻形, 长约为花柄的一半并与之紧贴; 花瓣长 0.5—0.7 毫米。果实卵形, 灰棕色, 长 2.5—3 毫米, 宽 2 毫米。花期 6 月, 果期 7 月。

一般栽培于菜园中或成野生状态。原产于地中海地区, 欧洲栽培历史悠久, 现世界各地均有。

嫩叶可作菜蔬, 根可供食用。果实在欧洲民间用于利尿。