

与原变种的不同在于植株高约 15 厘米,花瓣亮紫色。产我国西藏察隅。

2. 絨果芹 滇羌活 (中国种子植物科属辞典)

Eriocycla albescens (Franch.) Wolff in Engl. Pflanzenr. 90 (IV, 228): 107. 1927; Kitagawa in Rep. First Sci. Exped. Manch. Sect. 4: 36. 1936.——*Pimpinella albescens* Franch. Pl. David. 1: 239. 1884.——*Seseli provostii* de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 2(3): 842. 1903.——*Pituranthus provostii* de Boiss. in Bull. Soc. Bot. France 56: 349. 1909. nomen. nud.——*Pituranthus albescens* (Franch.) de Boiss. 1. c. 350. nomen. nud.

2a. 絨果芹 (原变种) 图版 5:8—10

Eriocycla albescens (Franch.) Wolff var. **albescens**

多年生草本,高 30—70 厘米。全株带淡灰绿色,多少被短柔毛。根圆锥形,粗约 1 厘米,褐色,常有分枝。茎直立,有细沟纹,基部稀疏分枝,分枝斜上开展。基生叶和茎下部叶的叶片 1 回羽状全裂,有 4—7 对羽叶,末回裂片长圆形,长 0.8—1.1 厘米,宽 0.6—0.8 厘米,基部有柄,向上近无柄,基部多不对称,全缘或顶端 2—3 深裂,裂片边缘有粗的深锯齿,叶片质硬,两面沿叶脉有短糙毛;茎生叶的末回裂片 3 深裂,最上部的叶简化成披针形,全缘,基部为膜质叶鞘。复伞形花序直径 3—5 厘米,花序梗长达 10 厘米;总苞片 1 或无,线形;伞辐 4—6,不等长;小伞形花序直径约 1 厘米,有花 10—20,小总苞片 5—9,披针状线形,顶端尖,比花柄短 $1/2—1/3$;花柄密生白毛;萼齿小,卵状披针形;花瓣倒卵形,白色,背部有短毛;子房密被长绒毛;花柱基短圆锥状,花期淡黄色,果期呈紫色,花柱长,叉开。分生果卵状长圆形,长 3—3.5(4) 毫米,宽 1.2—1.5 毫米,密生白色长毛,每棱槽中有油管 1,合生面油管 2。花期 8—9 月,果期 9—10 月。

产我国内蒙古及河北。生于石灰岩干燥山坡上。模式标本采自内蒙古萨尔沁。

2b. 大叶絨果芹

Eriocycla albescens (Franch.) Wolff var. **latifolia** Shan et Yuan, 植物分类学报 21(1): 88. 1983.——*Eriocycla albescens* non Wolff. 东北草本植物志 6: 226. 图 90. 1977.

本变种与原变种的不同在于全株稍有短毛,带淡绿色。叶的末回裂片大,长 2.5—5 厘米,宽 1.5—3 厘米,3 深裂,各裂片 2—3 裂。分布于辽宁西北部和河北。

3. 新疆絨果芹 图版 5:6—7

Eriocycla pelliotii (de Boiss.) Wolff in Engl. Pflanzenr. 90 (IV, 228): 106. 1927.——*Pituranthus pelliotii* de Boiss. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 16: 163. 1910.

多年生草本,高 20—40 厘米。根圆锥形,褐色。茎单一或分枝,有细条纹,被稀疏短毛。基生叶丛生,基部的卵形叶鞘互相环抱;叶片 1—2 回羽状分裂,有羽片 4—5 对,末回