

瓣卵形，长约1毫米，顶端短尖，不呈丝状；花丝短于花瓣，花药近圆形；花柱基在幼果时稍隆起，花柱短，直立或向外叉开。幼果长卵圆形，长约1毫米，主棱丝状，绿色，无毛。花期6—7月，果期7—8月。

产云南(维西)。生于海拔3700米的山坡。分布于锡金、印度。

本种茎单生，不分枝，呈花葶状，可和本属其它种类相区别，惟有花瓣顶端短尖，不呈丝状，与本属植物花的构造似乎有差异，但根据有块状根，果实侧扁，主棱丝状，无毛等特征又似本属植物的特点，目前暂将其纳入本属内，关于它的确切位置有待于今后进一步研究。

6. 星叶丝瓣芹 (植物分类学报) 图版 48

Acronema astrantiifolium Wolff in Fedde, Repert. Sp. Nov. 27: 192. 1929; 刘守炉、单人骅, 植物分类学报 18(2): 199. 1980.

直立草本，高25—50厘米。根块状至萝卜状，径约5毫米。茎单生或有少数分枝，有细条纹，无毛。基生叶有柄，柄长4—8厘米，叶鞘短窄，边缘膜质而抱茎；叶片轮廓呈半圆形或阔三角形，长1.5—3.5厘米，宽2—5厘米，3深裂近基部或为3小叶，小叶片或裂片呈卵圆形以至倒卵形，长1—2.5厘米，宽0.8—2厘米，基部楔形，上部有锯齿或深浅不等的缺刻状锯齿，表面绿色，背面淡绿色或带淡紫色；序托叶的柄呈鞘状，叶片通常3裂，裂片线形，全缘。顶生伞形花序梗长4.5—10厘米，侧生伞形花序梗细弱；无总苞片和小总苞片；伞辐5—12，不等长，长1.5—6厘米；小伞形花序有花7—12，花柄在幼果时长1—1.5厘米，纤细，一侧较粗糙；萼齿明显，狭三角形；花瓣卵形或卵状披针形，长2—3毫米，宽约0.5毫米，基部较窄，顶端丝状，长约占花瓣1/2到1/3，表面有乳头状毛；花丝长不超过1毫米，花药卵圆形；花柱基稍隆起，花柱向外叉开。果实近卵圆形，长、宽各约2毫米，主棱丝状；分生果横剖面近圆形，胚乳腹面平直。花期8—9月，果期9—10月。

产四川、云南。生于山坡林下或高山草坡，海拔2800—4200米。模式标本采自云南丽江。

7. 四川丝瓣芹 (植物分类学报) 图版 49:1—4

Acronema sichuanense S. L. Liou et Shan, 植物分类学报 18(2): 199. 1980.

细弱草本，高15—30厘米。根卵圆形，径约5毫米。茎有细条纹，无毛。较下部的茎生叶有柄，柄长2—5.5厘米，叶鞘短，边缘膜质；叶片轮廓呈阔三角形，通常为三出式2回羽状分裂，一回羽片柄长2—5厘米，二回羽片柄长0.2—2.5厘米，羽片近半圆形，长0.5—1.5厘米，宽0.6—1.7厘米，顶端3浅裂以至3深裂至基部，裂片倒卵形，顶端2—3浅裂；序托叶的柄呈鞘状，叶片3深裂，裂片线形，全缘或有少数缺刻状锯齿。顶生伞形花序梗纤细，通常无总苞片或偶有1枚；伞辐3—6，长1.5—4.5厘米，不等长，无毛；小伞形花序有花3—10，花柄不等长；无小总苞片；萼齿细；花瓣卵形至卵状披针形，长约3毫米，宽0.6毫米，顶端丝状，长约占花瓣2/3，光滑；花丝长约1毫米，花药近圆形；花柱基扁



星叶丝瓣芹 *Acronema astrantiifolium* Wolff: 1.植株, 2.序托叶, 3.花, 4.花瓣, 5.果实, 6.分生果横剖面。(史渭清绘)