

厘米长的柄,羽片阔卵形,长1.3—2厘米,宽约1.5厘米,先端2—3裂,裂片边缘有少数锯齿,中间的羽片通常3裂至基部,裂片倒卵形,先端3裂;较上部的茎生叶或序托叶近2回羽状分裂,末回裂片卵形至线形。伞形花序梗长约3厘米,无总苞片和小总苞片;伞辐5—7,长约1厘米,不等长;小伞形花序有花6—9,密集,花柄极短,长1—2毫米,其中有的近无柄;无萼齿;花瓣白色,卵状披针形,长约2毫米,宽0.5毫米,顶端长尖;花丝长约0.5毫米,花药近圆形,紫罗兰色。幼果卵形,主棱丝状。花期8月。

产我国西藏(米林、错那)。生于山坡林下湿地,海拔3800米。分布于锡金。

本种伞辐长约1厘米,花柄长1—2毫米,花白色,密集,可与本属其它种类相区别。

14. 西藏丝瓣芹 (植物分类学报) 图版 52:1—3

*Acronema xizangense* S. L. Liou et Shan, 植物分类学报 18(2): 202. 1980.

直立草本,高约40厘米。茎单生,有细条纹,无毛。茎下部叶有柄,柄长7—11厘米,细弱,叶鞘短,边缘膜质;叶片轮廓阔卵形或阔三角形,1—2回羽状分裂,第一回羽片柄长0.5—1.2厘米,羽片长1.5—2厘米,3全裂或3深裂至中部,末回裂片卵形至长椭圆形,全缘或先端2浅裂,边缘和上表面叶脉粗糙;序托叶的柄呈鞘状,叶片3全裂或1回羽状分裂,裂片线形,长0.8—1.5厘米,宽1—2毫米。顶生伞形花序梗较粗壮,无总苞片和小总苞片;伞辐6—9,长约3厘米,近等长;小伞形花序有花7—13,花柄丝状;无萼齿;花瓣白色,卵状披针形,长1.8—2.2毫米,宽约0.6毫米,顶端芒状尖,长约占花瓣的1/3,中脉1条;花丝短,花药近圆形;花柱基扁压,花柱在幼果时略长于花柱基,向外反折。果实阔卵形,长约1.8毫米,宽2毫米,基部近截形至微心形,主棱丝状;每棱槽内油管2—3;分生果横剖面近半圆形,胚乳腹面近平直。花期9月,果期10月。


产我国西藏米林。生于河谷侧坡。模式标本采自西藏米林。

本种基部叶的末回裂片(中间)呈卵形以至长椭圆形,全缘或顶端2浅裂,伞辐近等长,花白色,可与本属其它种类相区别。

15. 细梗丝瓣芹 (植物分类学报) 图版 52:4—5

*Acronema gracile* S. L. Liou et Shan, 植物分类学报 18(2): 202. 1980.

直立草本,高18—40厘米。块根近卵圆形,径5—7毫米。茎上部疏生分枝,有条纹,无毛。基部叶有柄,柄长7—13厘米;叶片轮廓呈阔三角形,三出式1—2回羽状分裂,一回羽片有1—1.8厘米长的柄,羽片呈阔卵状三角形,长2—4厘米,宽1.5—3.5厘米,3深裂或不分裂;裂片倒卵形,基部楔形,先端有少数钝锯齿,齿端有小尖头,上表面叶脉粗糙;序托叶退化,叶柄呈鞘状,叶片通常2—3深裂,裂片全缘或2—3浅裂。顶生伞形花序梗细弱,总苞片无或近无;伞辐5—6,极不等长,长1—1.5厘米,无小总苞片;小伞形花序有花4—7,花柄丝状,不等长;无萼齿;花瓣紫红色,阔卵形,长3—3.5毫米,宽约1毫米,顶端丝状,长约占花瓣的2/3,有腺毛;花丝极短,花药近圆形,长约0.3毫米;花柱基扁压,花柱短,向外叉开或反折。幼果卵形,主棱丝状,无毛。花期7月。



1—3. 西藏丝瓣芹 *Acronema xizangense* S. L. Liou et Shan: 1. 植株, 2. 花, 3. 花瓣。4—5. 细梗丝瓣芹 *Acronema gracile* S. L. Liou et Shan: 4. 叶, 5. 花。(史渭清绘)