

产我国西藏吉隆县。生于沟谷林下,海拔 3300—3800 米。模式标本采自西藏吉隆。

本种和环辐丝瓣芹 *A. radiatum* (W. W. Smith) Wolff 很接近,其区别在于后者伞辐极短,长约 1 厘米,花白色,密集,花柄长 1—2 毫米;而本种伞辐不等长,通常长 1—1.5 厘米,花柄较长,花通常紫红色。

16. 锡金丝瓣芹 (植物分类学报) 图版 53: 1—3

*Acronema hookeri* (C. B. Clarke) Wolff in Engl. pflanzenr. 90 (IV. 228): 323. 1927; H. Kanai in Univ. Mus. Univ. Tokyo, Bull. 8: 86. 1975; P. K. Mukherjee in Act. 2nd. Symp. Intern. Umbell. 51. 1977; Cannon in Hara et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal 2: 184. 1979; 刘守炉、单人骅,植物分类学报 18(2): 203. 1980.——*Pimpinella hookeri* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 686. 1894.——*Carum hookeri* (C. B. Clarke) Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris 8(6): 122. 1894.

直立草本,高 55—80 厘米。块根,径约 5 毫米。茎圆筒形,无毛,有条纹,多分枝,侧枝伸长。基生叶的叶柄长 4—8 厘米,叶鞘狭窄;叶片轮廓呈卵状三角形至长卵状三角形,通常 2 回羽状分裂,下面的一对羽片有短柄,末回裂片卵形,斜卵形至阔卵形,长 1—2 厘米,宽 7—13 毫米,3 深裂或有不整齐的少数细齿,表面沿叶脉和齿缘有不明显的细毛;序托叶小,叶柄呈鞘状,叶片 3 裂,裂片卵形至狭卵形,边缘有 1—3 裂齿或全缘。顶生伞形花序梗长 4.5—8 厘米;茎上部侧生伞形花序伸长,多数,近总状排列;无总苞片和小总苞片;伞辐 3—6,开展,略不等长,长 2.5—6 厘米;小伞形花序通常有花 5,花柄丝状,长 0.5—1.5 厘米;无萼齿;花瓣白色,披针形或长圆状披针形,长约 4 毫米,宽 0.6 毫米,顶端丝状,长约占花瓣的 2/3 至 3/4,有腺毛;花丝短,花药卵圆形;花柱基扁压,花柱在幼果时叉开。果实在未成熟时阔卵形,长约 2 毫米,基部近微心形,顶端渐狭,主棱丝状;每棱槽内油管 3。花期 8 月,果期 9—10 月。

产云南、西藏(错那)。生于林下或河沟边,海拔 2100—3200 米。分布于锡金、尼泊尔。

17. 多变丝瓣芹 (植物分类学报) 图版 53: 4—8

*Acronema commutatum* Wolff in Fedde, Repert. Sp. Nov. 27: 192. 1929; 刘守炉、单人骅,植物分类学报 18(2): 203. 1980.

直立草本,高 16—60 厘米。根短小,径约 2—4 毫米。茎圆柱形,细弱,有细条纹,无毛。基生叶有柄,柄长 2.5—5 厘米,叶鞘短窄,边缘膜质;叶片轮廓呈阔三角形,2 回羽状分裂,羽片 2—3 对,下面的一对羽片有短柄,末回裂片近阔卵形至倒卵形,长 0.5—1.2 厘米,宽约 0.6 厘米,先端通常 3 浅裂或有少数钝齿;序托叶的叶柄呈鞘状,叶片 3 裂或不裂,裂片线形。顶生伞形花序梗长 2.5—7 厘米,侧生的伞形花序多数,通常短缩,极少伸长;伞辐 2—6,不等长,长 1—3 厘米,极少长达 4.5 厘米,无总苞片和小总苞片;小伞形花序有花 2—4(—5),花柄丝状,不等长;花瓣狭披针形,长约 4 毫米,宽 0.2—0.3 毫米,顶



1—3. 绣金丝瓣芹 *Aconema hookeri* (C. B. Clarke) Wolff: 1. 植株, 2. 花, 3. 果实。4—8. 多变丝瓣芹 *Aconema commutatum* Wolff: 4. 植株, 5. 花, 6. 花瓣, 7. 果实, 8. 分生果横剖面。(史渭清绘)