

头状。分生果椭圆形或卵形，背面稍扁压，果棱翅状突起；每棱槽内油管 1，粗大，合生面油管 2；分生果横剖面近五角形。

单种属，分布于苏联中亚地区；我国仅产新疆。

本属模式种：西归芹 *Seselopsis tianschanicum* Schischk.

1. 西归芹 土当归(新疆)、天山邪蒿(高等植物图鉴) 图版 58

Seselopsis tianschanicum Schischk. in Bot. Mat. Herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS 13: 159. 1950 et in Komarov, Fl. URSS 16: 415. 1950; Korov. in Pavlov, Fl. Kazakh. 6: 308. 1963.

多年生草本，高 40—90 厘米。根增粗成纺锤状。茎单一，基部粗 4—6 毫米，下部带紫色，中空，表面有纵细条纹，无毛，从中部或中下部往上分枝。基生叶早枯萎；茎下部叶有长柄，叶柄基部扩展成披针形叶鞘；叶片轮廓卵形，2—3 回三出羽状全裂，一回羽片 3 对，有柄，末回裂片披针状线形，长 2—9 厘米，宽 1—5 毫米，无毛；茎上部叶较小，叶片 1 回羽状全裂，裂片较短，披针状线形，无柄，着生在披针形的叶鞘上。复伞形花序顶生和侧生，直径 5—9 厘米，伞辐 6—18，不等长，有棱，内侧粗糙或有白色短毛；无总苞片；小伞形花序多花，花柄不等长；小总苞片窄线形，多数，不等长，反折；花瓣白色或淡紫红色，外面的一瓣稍长。分生果卵形或椭圆形，长 3—4 毫米，宽 2 毫米，果棱翅状突起，侧棱较宽；每棱槽内油管 1，粗大，合生面油管 2。花期 7 月，果期 8 月。

产我国新疆。生于天山山区，海拔 1500—2500 米的草原灌丛中和草坡上。苏联中亚地区也有分布。

根药用，治跌打损伤、贫血等症。

50. 斑膜芹属——*Hymenolyma* Korov.

Korov. in Bot. Mat. Herb. Inst. Bot. et Zool. Ac. Soc. Uzbekist. 12: 30. 1948.

多年生一次结果的草本。具块根。基生叶有长柄，基部有宽阔叶鞘；叶片轮廓卵形或长圆形，3 回羽状全裂，末回裂片线形或披针状线形。复伞形花序有总苞片和小总苞片各 5，薄膜质；伞辐不等长；小伞形花序有花 6—15；无萼齿或萼齿不显著；花瓣白色，倒卵形，顶端微凹，有内折的小舌片；花柱基圆锥状，花柱短，叉开或弯曲。分生果长圆形或长圆状椭圆形，背腹略扁压，有宽阔的合生面，外果皮紧贴，果棱丝状突起；每棱槽内油管 1—4，合生面油管 2—10；心皮柄 2 深裂至基部。

本属有 2 种，分布在苏联中亚地区，我国新疆有产。

本属模式种：斑膜芹 *Hymenolyma trichophyllum* (Schrenk) Korov.



西归芹 *Seselopsis tianschanicum* Schischk.: 1.果枝, 2.根部, 3.花, 4.果实, 5.分生果横剖面。
(张荣生绘)