

数露出地面较高,逐年向上增长;叶革质或厚实有光泽。

本组我国产 8 种。

1. 岩风(陕西) 长虫七(陕西眉县、太白) 图版 66: 1—7


Libanotis buchtormensis (Fisch.) DC. Coll. Men. 5. tab. 3. fig. 5. 1829 et Prodr. 4: 149. 1830; Ledeb. Fl. Ross. 2: 78. 1844; Schischk. in Komarov, Fl. URSS 16: 473. 1950; Kryl. Fl. W. Sibir. 8: 2071. 1935; Korov. in Pavlov Fl. Kazakh. 6: 344. 1963; 傅坤俊, 植物分类学报 13 (2): 59. 1975; 秦岭植物志 1(3): 410. 1981.——*Bubon buchtormensis* Fisch. in Spreng. Pugill. 2: 55. 1815.——*Seseli buchtormense* (Fisch.) Koch in Nov. Act. Nat. Cur. 12 (1): 110. 1824; Ledeb. Fl. Alt. 1: 341. 1829; de Boiss. in Bull. Soc. Bot. France 53: 430. 1906.——*Seseli giraldii* Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 497. 1900.

多年生亚灌木状草本,高 0.2—1 米。根颈粗壮,径 1—3 厘米,一般长 2—4 厘米,但有时露出地面很高而达 14 厘米,存留密集的棕褐色枯鞘纤维;根圆柱状,径 1—2 厘米,长 8—30 厘米,灰棕色,下部有少数分枝。茎单一或数茎丛生,茎有棱角状突起的条棱和纵沟,光滑无毛,髓部充实,基部径 0.5—1.2 厘米,下部开始分枝,以上部分枝较多。基生叶多数丛生,有柄,叶柄长 2.5—12 厘米,三角状扁平,内面为宽阔浅纵槽,外面有纵长条纹,基部为宽阔叶鞘,边缘膜质;叶片轮廓长圆形或长圆状卵形,长 7—25 厘米,宽 5—12 厘米,2 回羽状全裂或 3 回羽状深裂,羽片无柄或极少有短柄,末回裂片卵形或倒卵状楔形,长 0.7—3 厘米,宽 0.5—1.5 厘米,有 3—5 锐锯齿,齿端有小尖头,光滑无毛,仅背面叶脉和叶轴偶有乳头状毛;上部茎生叶无柄,仅有狭长披针形叶鞘;叶片较小,分裂回数较少。复伞形花序多分枝,花序梗粗壮有条棱,花序直径 3—12 厘米;总苞片少数或无,线形或线状披针形,长 1—1.5 厘米,宽 1—1.2 毫米,有稀疏短毛;伞辐 30—50,有条棱,并有短硬毛,初时紧密,花后十分叉开;小伞形花序有花 25—40;小总苞片 10—15,线形或线状披针形,长 4—5 毫米,宽 0.8—1 毫米,与花等长或超过,外面密生柔毛;花瓣白色,近圆形,有小舌片,内曲,外部多柔毛;萼齿披针形;花柱外曲,花柱基圆锥形。分生果椭圆形,横剖面近半圆形,长 3 毫米,宽 2—2.3 毫米,果棱尖锐突起,密生短粗毛,沿果棱毛特多;每棱槽内油管 1,合生面油管 2;胚乳腹面平直,果实成熟后易分离和脱落。花期 7—8 月,果期 8—9 月。

产新疆(阿勒泰、特克斯、托里)、宁夏、甘肃(徽县、天水)、陕西(眉县、太白)、四川(康定)等省区。生于海拔 1000—3000 米的向阳石质山坡、石隙、路旁以及河滩草地。分布苏联(中亚、西伯利亚东部和西部)、蒙古。模式标本采自苏联。

根部入药,称长虫七,能发散风寒、祛风湿、镇痛、健脾胃、止咳、解毒。主治感冒、咳嗽、牙痛、关节肿痛、跌打损伤、风湿筋骨痛。

2. 伊犁岩风 图版 67: 1—7



1--7.岩风 *Libanotis buchtormensis* (Fisch.) DC.: 1.基生叶, 2.果序, 3.花及花瓣, 4.小总苞片, 5.总苞片, 6.果实, 7.分生果横剖面。8—10.香芹 *Libanotis seseloides* (Fisch. et Mey.) Turcz.: 8.根及基生叶, 9.果实, 10.分生果横剖面。(史渭清绘)