

和展开;小总苞片2—8,线形,长约2—4毫米;小伞形花序有花20余朵,花柄长2—4毫米;萼齿线状披针形,长与花柱基相等;花瓣白色,倒卵形,长1毫米,宽0.7毫米,有一长而内折的小舌片;花柱基圆锥形,花柱直立或两侧分开,长2毫米。果实近于四角状椭圆形或筒状长圆形,长2.5—3毫米,宽2毫米,侧棱较背棱和中棱隆起,木栓质,分生果横剖面近于五边状的半圆形;每棱槽内油管1,合生面油管2。花期6—7月,果期8—9月。

产我国各地。多生于浅水低洼地方或池沼、水沟旁。农舍附近常见栽培。分布于印度、缅甸、越南、马来西亚、印度尼西亚的爪哇及菲律宾等地。

茎叶可作蔬菜食用;全草民间也作药用,有降低血压的功效。

4. 卵叶水芹 图版81: 5—7

Oenanthe rosthornii Diels in Engl. Jahrb. 29: 498. 1900; de Boiss. in Bull. Acad. Geogr. Bot. 16: 185. 1906, et in Levl. Fl. Kouy-Tcheou. 298. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 722. 1933; Shan in Sinensia 12: 167. 1941; 中国高等植物图鉴 2: 1080. 图3889. 1972.


多年生草本,高50—70厘米,粗壮。茎下部匍匐,上部直立,有棱,被柔毛。叶片轮廓为广三角形或卵形,长7—15厘米,宽8—12厘米,末回裂片菱状卵形或长圆形,长3—5厘米,宽1.5—2厘米,顶端长渐尖,边缘有楔形齿和近于突尖。复伞形花序顶生和侧生,花序梗长16—20厘米;无总苞;伞辐10—24,不等长,长2—6厘米,直立和开展;小总苞片披针形,6—12,长4—6毫米;小伞形花序有花30余朵,花柄长2—5毫米;萼齿披针形,长不及1毫米;花瓣白色,倒卵形,长1—1.5毫米,宽0.7—0.8毫米,顶端有一内折的小舌片;花柱基圆锥形,花柱直立,长1—1.5毫米。果实椭圆形或长圆形,长3—4毫米,宽约2毫米,侧棱较背棱和中棱隆起,木栓质,分生果横剖面半圆形,每棱槽内油管1,合生面油管2。花期8—9月,果期10—11月。

产湖南、四川、贵州、广东、广西、云南。生于山谷林下水沟旁草丛中;海拔1400—4000米。模式标本采自四川南川扇子坪。

5. 线叶水芹 水芹菜(四川) 图版82: 1—3

Oenanthe linearis Wall. ex DC. Prodr. 4: 138. 1830; Shan in Sinensia 12: 168. 1941. — *Oenanthe javanica* (Blume) DC. subsp. *linearis* (Wall. ex DC.) Murata in Acta Phyt. 25: 103. t. 2. f. 4. 1973; Cannon in Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 187. 1979.

多年生草本,高30—60厘米,光滑无毛。茎直立,上部分枝,下部节上生不定根。叶有柄,柄长1—3厘米,基部有叶鞘,边缘薄膜质,叶片轮廓呈广卵形或长三角形,2回羽状分裂,基部叶末回裂片卵形,长1厘米,边缘分裂;茎上部叶末回裂片线形,长5—8厘米,宽2.5—3厘米,基部楔形,顶端渐尖,全缘。复伞形花序顶生和腋生,花序梗长2—10厘米;总苞片1或无,线形,长0.5—0.8厘米;伞辐6—12,不等长,长0.5—2厘米;小总苞片少



1—4. 水芹 *Oenanthe javanica* (Bl.) DC.: 1. 植株, 2. 花, 3. 果实, 4. 分生果横剖面。5—7. 卵叶水芹 *Oenanthe rosthornii* Diels: 5. 叶, 6. 果实, 7. 分生果横剖面。(陈荣道绘)