

数,线形,长2—3毫米;每小伞形花序有花20余朵,花柄长2—5毫米;萼齿披针状卵形,花瓣白色,倒卵形,顶端内折;花柱基圆锥形较萼齿短,花柱直立,叉式分开,长不及1毫米。果实近四方状椭圆形或球形,长2毫米,宽1.5毫米,侧棱较中棱和背棱隆起,背棱线形;每棱槽内油管1,合生面油管2。 花果期5—10月。

产云南、四川、贵州。生于山坡杂木林下溪边潮湿处;海拔1350—2800米。尼泊尔、印度、越南、印度尼西亚有分布。

6. 中华水芹

Oenanthe sinensis Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 496. 1903; Shan in Sinensia 12: 170. 1941; 中国高等植物图鉴 2: 1080. 图 3890. 1972.

多年生草本,高20—70厘米,光滑无毛,有束状须根。茎直立,基部匍匐,节上生根,上部不分枝或有短枝。叶有柄,柄长5—10厘米,逐渐窄狭成叶鞘,广卵形,微抱茎。叶片1—2回羽状分裂,茎下部叶末回裂片楔状披针形或线状披针形,长1—3厘米,宽2—10毫米,边缘羽状半裂或全缘,长1—3厘米,宽2—10毫米;茎上部叶末回裂片通常线形,长1—4厘米,宽1—2毫米。复伞形花序顶生与腋生,花序梗长4—7.5厘米,通常与叶对生;无总苞;伞辐4—9,不等长,长1.5—2厘米;小总苞片线形,多数,长4—5毫米,宽0.5毫米,长与花柄相等;小伞形花序有花10余朵,花柄长3—5毫米;萼齿三角形或披针状卵形,长约0.5毫米;花瓣白色,倒卵形,顶端有内折的小舌片;花柱基圆锥形,花柱直立,长3毫米。果实圆筒状长圆形,长3毫米,宽1.5—2毫米,侧棱略较中棱和背棱为厚;棱槽窄狭,有油管1,合生面油管2。 花期6—7月,果期8月。

产江苏、浙江、江西、湖南、湖北等地。生于水田沼地及山坡路旁湿地。模式标本采自湖北宜昌。

7. 蒙自水芹 图版 82: 8—10

Oenanthe rivularis Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 496. 1903.

多年生草本,高30—70厘米,光滑,有较多的细须根。茎直立,下部匍匐,单一或少分枝。叶有柄,长4—6厘米,叶片轮廓呈广三角形或三角形,长4.5—6厘米,宽3.5—6厘米,1回羽状深裂,稀有2回羽状深裂;茎下部叶裂片卵形,末回裂片长1—1.5厘米,宽0.5厘米,边缘有缺刻齿;茎上部叶末回裂片线形,长2—5厘米,全缘。复伞形花序顶生,花序梗长2—5厘米;无总苞片;伞辐6—7,不等长,长0.5—1厘米,直立或开展;小总苞片线形,多数,长约2毫米;小伞形花序有花20余朵,花柄长2—4毫米;萼齿披针形,长约0.3毫米;花瓣白色,倒卵形,长1毫米,宽0.5—0.6毫米,顶端有内折的小舌片;花柱基圆锥形,花柱直立或两侧分开,长约0.7毫米。果实椭圆形,长2毫米,宽1毫米,侧棱较中棱和背棱隆起,背棱线形;每棱槽内油管1,合生面油管2。 花期5—7月,果期7—8月。

产贵州、云南。生于沼地路旁潮湿处或山谷斜坡疏林下;海拔1100—2000米。模式标本采自云南蒙自。