

Dunn (1903) 根据 A. Henry 10822 采自蒙自的标本建立本种, 与线叶水芹 *Oenanthe linearis* 很接近, 但其主要区别点在于本种有较长的叶柄及短叶鞘, 叶片一般深裂。

8. 西南水芹 野芹菜(江西), 野芫荽(广西), 细叶水芹(秦岭植物志)

*Oenanthe dielsii* de Boiss. in Bull. Acad. Geogr. Bot. 16: 184. 1906; Shan in Sinensia 12: 170. 1941; 中国高等植物图鉴 2: 1079. 图 3888. 1972.

8a. 西南水芹(原变种) 图版 83: 1—6

*Oenanthe dielsii* de Boiss. var. *dielsii*

多年生草本, 高 50—80 厘米, 全体无毛。有短根茎, 支根须状或细长纺锤形。茎直立或匍匐, 下部节上生根, 上部叉式分枝, 开展。叶有柄, 长 2—8 厘米, 基部有较短叶鞘; 叶片轮廓为三角形, 2—4 回羽状分裂, 末回羽片条裂成短而钝的线形小裂片, 长 2—12 毫米, 宽 1—2 毫米; 花序梗长 2—23 厘米, 与叶对生; 无总苞; 伞辐 5—12, 长 1—3 厘米; 小总苞片线形, 少数, 较花柄为短; 小伞形花序有花 13—30, 花柄长 2—4 毫米; 萼齿细小卵形; 花瓣白色, 倒卵形, 顶端凹陷, 有内折的小舌片; 花柱基短圆锥形, 花柱长 1.5—2 毫米。果实长圆形或近圆球形, 背棱和中棱明显, 侧棱较膨大, 棱槽显著, 分生果横剖面呈半圆形, 每棱槽内油管 1, 合生面油管 2。花期 6—8 月, 果期 8—10 月。

产广西、浙江、江西、四川、陕西等省区。生于山坡、山谷林下阴湿地或溪旁; 海拔 750—2000 米。模式标本采自四川。

幼苗可作蔬菜食用。

8b. 细叶水芹 野芹菜(江西) 图版 83: 7

*Oenanthe dielsii* de Boiss. var. *stenophylla* de Boiss. in Bull. Acad. Geogr. Bot. 16: 185. 1906; Shan in Sinensia 12: 171. 1941.——*Oenanthe caudata* Norman in Journ. Botany 67: 147. 1929.

本变种与原变种的主要区别在于叶片有较多回的羽状分裂, 末回裂片线形。花期 6—8 月, 果期 8—10 月。

产江西、湖北、四川、贵州。生于山谷杂木林下溪旁水边草丛中; 海拔 1500—2000 米。模式标本采自四川城口。

幼苗可作蔬菜食用。

9. 多裂叶水芹 图版 83: 8—10

*Oenanthe thomsonii* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 697. 1879; P. K. Mukherjee in Act. 2nd. Symp. Intern. Umbell. 59. 1977; Cannon in Hara et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal 2: 187. 1979.

多年生草本, 高 20—50 厘米。植物体光滑无毛。根圆锥形或须根状。茎细弱, 匍匐并分枝, 下部节上生根。叶有柄, 长 2—6 厘米, 基部有短叶鞘; 叶片轮廓三角形或长圆