

片无柄,末回裂片线形,长2—3毫米,宽0.5—1毫米;茎上部叶无柄,较小,裂片更细。复伞形花序1—3,稀稍多,直径4—8厘米;伞辐12—15,较粗壮,近等长;总苞片多数,2—3回羽状全裂,裂片线形,毛发状,膜质;小伞形花序有多数花;小总苞片与总苞片相似,但较小,与小伞形花序等长;萼齿不显著;花瓣白色,广椭圆形,顶端微凹,有内折的小舌片,长约1.5毫米;花柱基圆锥状,花柱长约2毫米,超过花柱基2—3倍,直立或斜升,柱头头状。分生果长圆状卵形,长3—4毫米,宽1.5—2毫米。花期7月,果期8月。

产我国新疆。生于高山山坡或高山草甸、林下或灌木丛中。苏联亚洲部分和蒙古也有分布。

2. 白花苞裂芹 图版 85

Schultzia albiflora (Kar. et Kir.) M. Pop. Fl. Almaat. Gos. Zapovedn. 35. 1940; Schischk. in Komarov, Fl. URSS 16: 541. 1950; Korov. in Pavlov, Fl. Kazakh. 6: 329. 1963. — *Chamaescidium albiflorum* Kar. et Kir. Bull. Soc. Nat. Mosc. 15 (2): 360. 1842.

多年生草本,高约20厘米。根颈有暗褐色残存叶鞘。根圆锥形。茎通常不发育,由基部发出多数斜升的枝或同时有短缩的茎。基生叶有柄,柄的基部扩展成鞘,边缘膜质;叶片轮廓长圆形,3回羽状全裂,末回裂片披针状线形或线形,长2—4毫米,宽0.5—1毫米,无毛。复伞形花序多数;伞辐10—20,不等长;总苞片多数,2回羽状分裂,末回裂片线形或毛发状;小伞形花序有多数花;小总苞片与总苞片相似,但较小,约与花柄等长;无萼齿;花瓣白色,广椭圆形,顶端微凹,有内折的小舌片,长约1毫米;花柱基圆锥状,花柱在果期外弯,长约1毫米,柱头头状。分生果长圆状卵形,长约3毫米;每棱槽内油管3,合生面油管8。花期7月,果期8月。

产我国新疆。生于高山草甸和山坡上。苏联中亚地区也有分布。

59. 茴香属——*Foeniculum* Mill.


Mill. Gard. Dict. Abr. ed. 4. 1754; Adans. Fam. Pl. 2: 101.

1763. — *Ozoida* Wight et Arn. Prodr. Fl. Ind. Or. 1: 374.

1834.

一年生或多年生草本,有强烈香味。茎光滑,灰绿色或苍白色。叶有柄,叶鞘边缘膜质;叶片多回羽状分裂,末回裂片呈线形。复伞形花序,花序顶生和侧生;无总苞片和小总苞片;伞辐多数,直立,开展,不等长;小伞形花序有多数花;花柄纤细;萼齿退化或不明显;花瓣黄色,倒卵圆形,顶端有内折的小舌片;花柱基圆锥形,花柱甚短,向外反折。果实长圆形,光滑,主棱5条,尖锐或圆钝;每棱槽内有油管1,合生面油管2;胚乳腹面平直或微凹;心皮柄2裂至基部。

本属约4种,分布于欧洲、美洲及亚洲西部。我国有1种。



白花苞裂芹 *Schultzia albiflora* (Kar. et Kir.) M. Pop.

1. 植株, 2. 叶羽片放大, 3. 总苞片, 4. 小总苞片, 5. 花。(张荣生绘)