

腹稍扁压,果棱突起,粗钝,有边缘为齿状的硬薄膜,棱槽狭窄,每棱槽内油管 1,合生面油管 2;胚乳腹面平直。

本属有 3 种,分布于苏联中亚地区 and 西伯利亚;我国有 2 种,都产新疆。

本属模式种:狭腔芹 *Stenocoelium athamantoides* (M. B.) Ledeb.

狭腔芹属分种检索表

1. 茎明显,长 8—20 厘米;花柄长,无毛或近光滑;果实无毛或果棱有稀疏的硬毛…………… 1. 狭腔芹 *S. athamantoides* (M. B.) Ledeb.
1. 茎无或不明显,长不过 7 厘米;花柄短,有密毛;果实密被短毛…………… 2. 毛果狭腔芹 *S. trichocarpum* Schrenk

1. 狭腔芹 图版 94: 5—8

Stenocoelium athamantoides (M. B.) Ledeb. Fl. Alt. 1: 298. 1829; Schischk. in Komarov, Fl. URSS 16: 470. 1950; Korov. in Pavlov, Fl. Kazakh. 6: 341. 1963. — *Cachrys athamantoides* M. B. Fl. Taur.-Caus. 3: 217. 1819.


多年生草本,高约 15 厘米,根粗,木质化,分叉;根颈长,有残存的叶柄纤维。茎圆柱形,有较深沟槽和短硬毛,通常带紫红色,近基部分枝,约 3—5 枝。茎生叶多数,呈莲座状,叶有柄,叶柄的基部扩展成披针形的叶鞘;叶片轮廓长圆形,2 回羽状全裂,第一回羽片广卵形或椭圆形,再羽状深裂,末回裂片披针形,锐尖,长 3—5 毫米;枝上的叶较小,着生在披针形的叶鞘上。顶生复伞形花序最大,直径达 20 厘米,侧棱上的花序较小;伞辐 9—28,不等长,有短硬毛;总苞片多数,线形,几乎全部膜质,有短毛;小伞形花序有多数花;花柄不等长;小总苞片与总苞片近似,但较小,边缘膜质;萼齿三角状披针形;花瓣白色或淡紫红色,倒心形,顶端微凹,有内折的小舌片,长约 1 毫米。分生果卵形,长约 5 毫米,有时带紫红色,无毛或有硬毛;每棱槽内油管 1,合生面油管 2。花期 7 月,果期 8 月。

产我国新疆。生于山区砾石质山坡上。苏联中亚地区和西伯利亚也有分布。

2. 毛果狭腔芹 图版 94: 1—4

Stenocoelium trichocarpum Schrenk in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. 1: 80. 1841; Schischk. in Komarov, Fl. URSS 16: 470. 1950; Korov. in Pavlov, Fl. Kazakh. 6: 340. 1963.

多年生草本,高 7 厘米或无茎,全株有短毛,主根粗长;根颈有残存叶鞘纤维。茎短,无茎时,从根部发出多数枝条,长 2—18 厘米,有时有茎,同时也有基生侧枝。基生叶多数,呈莲座状,有短柄,叶柄的基部扩展成披针形的鞘,有短毛;叶片长圆形,2 回羽状全裂,第一回羽片再羽状深裂,末回裂片长圆状披针形或披针形,锐尖,长 1—3 毫米,宽 0.5—1 毫米,两面密生短绒毛。中央的复伞形花序较大,直径达 10 厘米,有多数不等长的伞辐,侧生的伞形花序较小;总苞片多数,披针状线形,有毛,几乎全部膜质,有时还具苞叶;小伞形



1—4. 毛果狭腔芹 *Stenocoelium trichocarpum* Schrenk: 1. 植株, 2. 小总苞片, 3. 花及幼果, 4. 分生果横剖面。 5—8. 狭腔芹 *Stenocoelium athamantoides* (M. B.) Ledeb.: 5. 茎基部、根及基生叶, 6. 果序, 7. 果实, 8. 分生果横剖面。(张荣生、韦力生绘)