

8(6): 135. 1894; Shan in *Sinensia* 12: 175. 1941; Leute in *Ann. Naturhistor. Mus. Wien* 74: 491. Taf. 14. fig. 4. 1970; 中国高等植物图鉴 2: 1083. 图 3896. 1972.——*Trachydium daucoides* Franch. in *Nouv. Mus. Paris* 2(8): 245. 1886.

多年生草本，高20—50厘米。根颈密被纤维状枯萎叶鞘；根长可达10厘米，径1.5厘米，常分叉。茎单生而具分枝，圆柱形，具纵沟纹。基生叶具长柄，柄长8—18厘米；叶片轮廓长圆状卵形，长8—20厘米，宽4—5厘米，3—4回羽状全裂，羽片5—6对，末回裂片线形，长3—4毫米，宽1毫米；茎生叶叶柄全部鞘状，叶片简化。复伞形花序直径7—10厘米；总苞片少数，长1.5—2.5厘米，叶状，早落；伞辐14—23，粗糙，不等长，长1.5—6厘米，果期向外反曲；小总苞片8—10，长1—2厘米，2回羽状深裂；萼齿1—2，长可达2毫米；花瓣内面白色，外面常呈紫色，长卵形，长2毫米，具内折小尖头；花丝白色，花药青黑色；花柱基隆起，花柱2。分生果背腹扁压，长圆形，长6—8毫米，宽3—4毫米，背棱略突起，侧棱扩大为宽1毫米的翅；背棱槽内油管1，侧棱槽内油管2—3，合生面油管4—6；胚乳腹面平直。花期7—8月，果期9—10月。

产云南、四川。生于海拔2500—4000米的山坡草地。模式标本采自云南。

14. 多管蕺本 图版 104:5—7


Ligusticum multivittatum Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris* 8(6): 133. 1894.——*Ligusticopsis multivittata* (Franch.) Leute in *Ann. Naturhistor. Mus. Wien* 73: 74. Taf. 4. fig. 2. Abb. 3. fig. c. 1969.

多年生草本，高20—40厘米。根圆锥形，伸长；根颈被纤维状残留叶鞘。茎自基部分枝，圆柱形，具细条纹。基生叶具柄，柄长5—12厘米，基部扩大成鞘；叶片轮廓卵状三角形，长5—7厘米，宽3—5厘米，2—3回羽状全裂，末回裂片线形，长3—6毫米，宽1毫米，先端具小尖头，脉上及边缘常散生细毛；茎生叶少数，简化。复伞形花序直径3—4厘米；总苞片1—2，羽状分裂，裂片线形，多毛，早落；伞辐7—20，略不等长，长1—2厘米，具糙毛；小总苞片多数，羽状分裂，具糙毛；萼齿发育，线形；花瓣白色，倒卵形，先端具内折小尖头。分生果背腹扁压，长圆形，长4—6毫米，宽3毫米，背棱稍突起，侧棱扩大呈翅状；背棱槽内油管3—4，侧棱槽内油管4—5，合生面油管8—10；胚乳腹面平直。花期8—9月，果期10月。

产云南维西、鹤庆。生于海拔3000—4000米的竹林草地。模式标本采自云南马耳山。

15. 归叶蕺本 当归叶蕺本(秦岭植物志) 图版 103:4—8

Ligusticum angelicifolium Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris* 8(6): 133. 1894; Wolff in *Fedde, Repert. Sp. Nov.* 12: 453. 1922; *Hand-Mazz. Symb. Sin.* 7: 723. 1933; 秦岭植物志 1(3): 417. 1981.——*Ligusticopsis angelicifolia* (Franch.) Leute in *Ann. Naturhistor. Mus. Wien* 73: 70. Taf. 3. fig. 2. Abb. 3.



1—4. 抽葶藁本 *Ligusticum scapiforme* Wolff:
1. 植株, 2. 小总苞片, 3. 果实, 4. 分生果横剖面。5—7. 多管藁本 *Ligusticum multivittatum* Franch.: 5. 小总苞片, 6. 果实, 7. 分生果横剖面。(韦力生绘)