

较厚,从横剖面显示,侧翅比尖锐的背棱宽 2 倍;总苞片多数;叶末回裂片楔形,顶端齿状分裂……

- …………… 78. 欧当归属 *Levisticum* Hill
 1. 果实扁圆形;分生果的胚乳腹面凹陷,横剖面呈五角形,背部稍扁压;果棱全部有翅,木栓质,边沿有柔毛;油管多数 …………… 79. 珊瑚菜属 *Glehnia* Fr. Schmidt ex Miq.

72. 山芎属——*Conioselinum* Fisch. ex Hoffm.

Fisch. ex Hoffm. Gen. Umbell. ed. 2, 185. 1816.

多年生草本。茎直立,圆柱形,中空,具纵条纹。叶具柄,基部扩大成鞘;叶片二至三回羽状全裂。复伞形花序顶生和侧生;总苞片少数或无;小总苞片多数,线形;花白色;萼齿不发育;花瓣卵形至倒卵形,具内折小舌片;花柱基隆起至圆锥状。分生果背腹扁压,长圆状卵形至卵形,背棱狭翅状,侧棱成宽翅;每棱槽内油管 1—3,合生面油管 2—6。胚乳腹面平直或微凹。

本属约 4 种,分布于北半球。我国约 3 种,产于新疆、安徽、江西及台湾等省区。

本属模式种: *Conioselinum tataricum* Hoffm.

分 种 检 索 表

1. 叶二回羽状全裂;小总苞片长 0.5—1 厘米……………
 …………… 1. 山芎 *C. chinense* (L.) Britton, Sterns et Poggenburg
 1. 叶二至三回三出式羽状全裂;小总苞片长约 0.5 厘米……………
 …………… 2. 鞘山芎 *C. vaginatum* (Spreng.) Thell.

1. 山芎(新拟) 图版 1

Conioselinum chinense (L.) Britton, Sterns et Poggenburg Prel. Cat. N.Y. 1888; Hiore et Constance, Umbell. Japan 89. f. 46. 1958. — *Athamantha chinensis* L. Sp. Pl. 245. 1753. — *Cnidium chinense* Spreng. Pl. Umbell. Prodr. 40. 1813; Steud, Nom. Bot. ed. 2, 1: 389. as syn. 1840. — *Ligusticum gmelini* Chara. et Schlecht. Linnaea 1: 391. 1826. — *Conioselinum kamtschaticum* Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. 22. 1859. — *Peucedanum filicinum* Wolff in Fedde, Repert. Sp. Nov. 21: 246. 1925. — *Conioselinum nipponicum* Hara, Jour. Jap. Bot. 17: 631. f. 52. 1941.

多年生草本,高 0.5—1 米。根棕褐色,多分叉。茎直立,上部分枝,圆柱形,具细条纹。基生叶未见。茎生叶具柄,柄长约 5 厘米,基部扩大成叶鞘;叶片轮廓卵形至三角状卵形,长 15—20 厘米,宽 10—15 厘米,二回羽状全裂;一回裂片卵形,长 1—3 厘米,宽 0.5—2 厘米,羽状深裂;末回裂片线形,长 3—5 毫米,宽 1—3 毫米。复伞形花序顶生和侧生;总苞片 1—2,线形,长 1—1.5 厘米,边缘狭膜质。伞辐 10—13,略不等长,长 2—3 厘米,略粗糙;