

卵形或卵状披针形,长4—9厘米,宽8—25毫米,基部极下延,成翅状叶轴,顶端渐尖或锐尖,边缘有具白色软骨质的细密尖锯齿,两面均无毛,或仅主脉上有短糙毛;茎上部叶常简化为长叶鞘,仅顶端有分裂的小叶片。复伞形花序径3—8厘米,花序梗长2—6厘米,有短糙毛,伞辐7—14,无总苞片;小伞花序有花10—25,小总苞片2—4,线状钻形,边缘宽膜质;花白色;无萼齿;花瓣卵圆形,渐尖,先端内卷;花柱基扁圆锥状。果实椭圆形至卵圆形,长2—4厘米,宽1.5—3厘米,背棱狭翅状,稍隆起,侧棱具狭翅,比果体狭,棱槽内有油管1—2,合生面有油管4,油管明显,黑褐色,扁而宽。花期8—9月,果期9—10月。

产吉林、辽宁等省。生长于山坡、林下、林缘、灌丛中。分布于日本、朝鲜。模式标本产于朝鲜中部。

1c. 骨缘当归(变种)(江苏南部种子植物手册)山萸本、野芹菜(江苏)图版5: 5—9
var. *foliosa* Yuan et Shan in Bull. Nanjing Bot. Gard. Mem. Sun Yat-Sen 1983: 5. fig. 1.5—9. — *Angelica cartilaginomarginata* auct. non Nakai: 江苏南部种子植物手册555. 图896. 1959; 江苏植物志下册: 580. 图1673. 1982.

本变种与原变种形态相似,但植株粗壮,叶较茂密。茎高1—1.5米,粗达1.5厘米。叶为三出式二回羽状分裂(有时下部叶非三出式),二回羽片有裂片5—7,末回裂片长圆形,长5—6.5厘米,宽2—3厘米,边缘多2—3深裂。

产江苏的宁镇山区及邻近的安徽部分山地。生长于山坡、林下草丛中。模式标本采自江苏宝华山。


2. 秦岭当归(秦岭植物志) 图版6

Angelica tsinlingensis K. T. Fu in Fl. Tsinling. 1: 3, 420, 461. f. 358. 1981; Yuan et Shan in Bull. Nanjing Bot. Gard. Mem. Sun Yat-Sen 1983: 5.

根圆锥形,高60—130厘米。茎直立,中空,淡绿色,近无毛,上部分枝。基生叶有长柄,三出全裂或羽状3小叶,中间小叶菱状倒卵形,有短柄,长7—13厘米,宽5—9厘米,侧小叶宽卵形,常有1—2浅裂,顶端有短渐尖头,基部截形、短楔形或浅心形,有柄或无柄,边缘有不整齐粗锯齿;茎生叶有柄,三出式至二回三出羽状全裂,小叶与基生叶同形,有柄;茎上部叶简化为3深裂或仅有狭长圆筒状叶鞘。复伞形花序顶生及侧生;花序梗长6—12厘米,无总苞;伞辐20—25,极不等长,果期长达8厘米,略下弯;小总苞片6—8,披针状线形,长5—8毫米;小伞形花序有花25—35,花柄纤细,长达1厘米(果期达1.8厘米);萼齿细小;花瓣宽倒卵形,花序外缘的花瓣略大,长1.8—2.2毫米,凹陷处有内折的小舌片;花柱基短圆锥状,比花柱短2倍。果实长圆形或近圆形,长3—6毫米,宽3—4毫米;分生果背棱有极狭翅,显著隆起。每棱槽内有油管2—3,合生面油管4,油管紧连于种皮上。

花期8—9月,果期9—10月。

产秦岭北部,较普遍。生长于海拔1200—2300米的山谷疏林下及山坡灌丛中。模式标本采自陕西华阴华山。



藏岭当归 *Angelica tsinlingensis* K. T. Fu 1.茎生叶, 2.果序, 3.花, 4.果实, 5.分生果横剖面。
(李志明绘)