

叉开。果实卵圆形,长4—5毫米,宽3—4毫米,侧棱狭翅状,比果体狭,主棱线状,显著隆起,分果棱槽中有油管1,合生面油管2,油管深褐色,呈明显的条状。花期7—8月,果期8—9月。

产四川西北部(小金)和东北部(城口)。生长于海拔1500—3000米的高山灌丛和草地上。模式标本采自城口。

本属尚有以下9种未见标本,兹将这些种原始记载的主要特征摘要如下,以供参考。

30. 湖北当归(新拟)

Angelica cincta de Boiss. in Bull. Soc. Bot. France **53**: 436. 1906.

茎高,粗壮。叶片二回三出羽状分裂,末回裂片有时深3裂,近菱形或卵形,边缘有规则的浅齿,或近重齿,齿端有短尖头。上部叶简化为一膨大的叶鞘。伞幅16—18;无总苞片;小总苞片多数。伞形花序具多数花;花瓣卵形,渐尖,先端反卷;花药红色。分生果极扁压,狭椭圆形,背棱丝状,侧棱稍呈丝状,宽度近于分生果宽度的一半,棱槽内有油管1,合生面油管4。

模式产地为湖北。

31. 城口当归(新拟)

Angelica dielsii de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. **3**: 850. 1901.

茎下部无毛。叶片二回羽状分裂,下部的羽片3裂,所有的裂片均具锯齿至牙齿,齿多,且不等大;叶鞘卵形,膨大。花序梗上部有长柔毛,无总苞片;小总苞片小;花白色至玫瑰红色,花瓣倒心形,顶端具短尖。幼果与疏叶当归 *A. laxifoliata* 相近。

模式标本(Farges)采自四川城口。

32. 雪山当归(新拟)

Angelica forrestii Diels in Not. Bot. Gard. Edin. **5**: 289. 1929.

植株高60—90厘米。茎直立,无毛。叶柄长5—7厘米,基部叶鞘长5—6厘米;叶片三回三出羽状深裂,草质,上表面无毛,下表面叶脉上疏生柔毛。花绿色;总苞片披针形或线形,不等长,反卷,稀脱落;伞幅18—26;小总苞片线形,与花近等长,长5—8毫米;伞形花序有花20—30;萼齿细,三角形;花瓣倒卵形,顶端反折,长1.5—2.5毫米,宽1.2—1.5毫米;雄蕊长2—3毫米;花柱短。

全株芳香,具茴香气味。

模式标本(G. Forrest no. 1580)采自云南丽江,生长于雪山东坡的松林边缘。

33. 宜昌当归(新拟)

Angelica henryi Wolff in Fedde, Repert. S. Nov. **28**: 109. 1930.

植株高大。茎上部密生短柔毛至硬毛,圆柱形,有条纹,中空。序托叶无柄;叶鞘小,两面均具短糙毛;叶片二回羽状分裂,小叶羽对少,小叶片无柄,披针形,渐尖,先端有长尖,通常叶缘密生锯齿,长达25毫米,宽达10毫米。复伞形花序直立,无总苞片;伞幅12—