

产我国湖南、江西、浙江、广西、广东、福建等省区。生长于山坡灌木林下或林缘、草丛中。模式标本采自广州白云山。

根入药,有疏风清热、活血化瘀、行气止痛等功能。用于治风热咳嗽、心绞痛、胃痛、疟疾、痢疾、经闭、白带、跌打损伤等。

3. 疏毛山芹(南京中山植物园论文集) 黄蘗本(云南维西) 图版 29


Ostericum scaberulum (Franch.) Yuan et Shan in Bull. Nanjing Bot. Mem. Sun Yat-Sen 1984—1985:3. — *Angelica scaberula* Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris 8(6):141. 1894; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:726. 1933.

多年生草本。根圆柱形,长10—15厘米,棕褐色,根头大,被褐色的膜质鳞片,有数个肉质支根,支根表面有结带状及点状突起。茎直立,有时带紫色,高50—70(—100)厘米,粗0.3—0.6厘米,无毛或稍有毛,有细纵沟纹。二回三出式羽状分裂,叶柄长6—10(—18)厘米,基部膨大成膜质的管状叶鞘;叶片阔卵形,长15—25厘米,宽15—20厘米;茎顶部叶简化成兜状叶鞘;末回裂片卵圆形至长椭圆形,长3.5—6.5厘米,宽2.5—5厘米,顶端有长尖或尾尖,基部多不等大,边缘有缺刻状粗锯齿,锯齿略向内曲,齿端有小尖头,叶缘及叶背面脉上疏生柔毛。复伞形花序,花序梗长7—15厘米;总苞片2—5,披针形,有糙毛,常早落;伞辐13—19(—29),有短糙毛;小伞花序有花20—30(—40);小总苞片6—12,线状披针形,带紫色,与花柄近等长,顶端有尾尖,反折,有糙毛。花白色或黄白色;萼齿三角形;花瓣卵圆形,顶端稍内折,基部渐狭成爪状,中脉明显。果实卵圆形至近圆形,长5—7毫米,宽4—6.5毫米,金黄色,薄膜质,顶端及基部明显内凹,于放大镜下可见果实表面有许多点泡状突起。背棱线形,彼此接近,侧棱宽翅状,宽度远超过果体,棱槽中有油管2,合生面油管4。花期7—9月,果期9—10月。

产云南(德钦、中甸、维西、丽江、剑川、鹤庆)。生长于海拔2700—3300米的山坡、路边草丛内或杂木林中。模式标本采自鹤庆马耳山。

4. 山芹(辽宁) 山芹当归(中国高等植物图鉴)、山芹独活(东北植物检索表)、小芹当归(北京植物志)、背翅当归(拉汉种子植物名称)、秦陇当归(经济植物手册)、米格当归(通称)、望天芹(千山)、山芹菜(东北地区)

Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai in Journ. Jap. Bot. 18:219. 1942; Kitagawa in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 5(1):26. 1960; Kitagawa Neo-Lineam. Fl. Mansh. 485. 1979; Yuan et Shan in Bull. Nanjing Bot. Mem. Sun Yat-Sen 1984—1985:3. — *Peucedanum sieboldii* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3:63. 1867. — *Angelica miqueliana* Maxim. Mel. Biol. 9:255. 1873; Franch. Pl. David. 1:42. 1884; Forbes et Hemsley in Journ. Linn. Soc. 23:334. 1888; 东北植物检索表 248. 图 77-3. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 1091. 图3911. 1972. — *Peucedanum miqueliana* Wolff in Fedde, Repert. Sp. Nov. 21:248. 1925 in nota. — *Angelica urticifoliata* Wolff in



兴安前胡 *Peucedanum baicalense* (Redow.) Koch: 1. 植株下部, 2. 植株上部, 3. 花, 4. 子房。
(陈荣道绘)