

裂,3对羽片,羽片2—3全裂,末回裂片狭披针形至线形,急尖,长1—1.5(—2)厘米,宽1—2毫米;茎生叶少数,相似但极简化,3深裂,叶鞘宽阔抱茎。伞形花序2,侧生者很小,顶生的具伞辐10—15,有槽,不等长,长达3.2厘米;总苞片1或很少为2,线形,长0.4厘米;小伞形花序多花;小总苞片多数,线形,渐尖,边缘膜质,不等长,长0.45厘米;花柄长约1厘米;花白色,花瓣宽匙形,顶端内折;花柱基圆锥形。分生果倒心形,背部扁压,背棱稍突起,长0.55厘米,宽0.4厘米,侧翅宽1毫米,白色,棱槽内油管2—3,合生面6。

模式标本产蒙古西北部,生长于潮湿冲积地(Price 108)。我国内蒙古可能有分布。

38. 乳头前胡(新拟)

Peucedanum piliferum Hand-Mazz. in Ost. Zeits. Heft. **3**(82): 252. 1933.

高45厘米。茎圆柱形,空管状,无毛,具条纹。下部叶柄长8厘米;叶片轮廓卵形,长11厘米,宽8厘米,3—4对羽片,有时可达6对,羽片无柄,疏离,末回裂片线状倒卵形,长1.5—7毫米,宽约1毫米,先端钝,厚实,干后呈暗绿色。花序梗长6.5厘米;伞辐20,长3厘米,伞辐和花柄均生有乳头状突起;总苞片约10,线形,与伞辐大致等长,极尖,草绿色,3脉,边缘淡褐色;小伞形花序有花约30,花柄在花期长约7毫米,等长;小总苞片12,羽状分裂,有毛。子房多乳头状突起;萼齿细小,卵形;花瓣宽卵形,长2毫米,先端内折;雄蕊少数,较长,白色,花柱细,直立。果实不详。

模式标本采自我国东北部 Tygrove-Gebiet (Fenzl 352)。

本属尚有2种,经查对模式标本的照片和原始记载,认为不属于本属植物,拟作为其他有关属种的新异名补列如下:

1. 宜昌东俄芹 **Tongolooa dunnii** (de Boiss.) Wolff in Engl. Pflanzenr. **90** (IV. 228): 317. 1929. — *Peucedanum giraldii* Diels in Bot. Jahrb. **29**: 503. 1900. Syn. Nov.

P. giraldii Diels 的模式产地: 太白山, Giraldi n. 1329。秦岭植物志 **1**(3): 407. 1981 曾将这种前胡作为太白茴芹 *Pimpinella giraldii* (Diels) de Boiss. ex Diels 的异名, 并又提出其可能为城口东俄芹 *Tongolooa silaifolia* (de Boiss.) Wolff 的一个异型。根据我们从意大利佛罗伦萨大学标本馆 (Herb. Univ. Florence) 得到的这种前胡的模式照片看来,植物的外形,基生叶和茎生叶以及花序等都与宜昌东俄芹相似,因而列为此种的异名。

2. 短片藁本 **Ligusticum brachylobum** Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris **8** (6): 134. 1894. — *Peucedanum cavaleriei* Wolff in Fedde, Repert. Sp. Nov. **21**: 246. 1925. Syn. Nov.

根据 H. Wolff 对 *P. cavaleriei* 的描述,果序后期基部收缩靠拢的特征似应为藁本属植物,又根据他对植物体各部分的描述看来,很可能为短片藁本。