

羽状分裂;末回裂片线形或披针形,长2—5厘米,宽0.5—1厘米,先端尖锐;茎生叶逐渐短缩。复伞形花序顶生或侧生,花序梗长18—26厘米;总苞片4—5,披针形,长4—8毫米;伞辐6—9,不等长;小伞形花序有多数花;小总苞片线形或丝形,有毛;花白色,花瓣长1.5毫米,辐射瓣长4—6毫米,2裂;花柄长2—5毫米;子房被有密毛,花柱较长;萼齿细小。果实椭圆形,背部极扁平,长5—6毫米,有柔毛,背棱较细,棱槽内油管1,合生面油管2,其长度为分生果长度的一半或略超过。花期6—8月,果期9—10月。

产我国西藏、青海、甘肃、四川等省区。生长于海拔2500—5000米的山坡草地。模式标本采自甘肃莲花山。

本属尚有5种仅见于文献记载,迄今未见标本,现将原记载特征摘录于下,以供参考。

未列组

27. 丽江独活(新拟)

Heracleum likiangense Wolff in Fedde, Repert. Sp. Nov. 33: 78. 1933.

多年生草本,高约30厘米。茎圆筒形,有纵沟纹,不分枝,无毛。茎中、下部叶轮廓宽卵形,长约10厘米,三出分裂,侧生裂片有柄,长1—3厘米,倒卵形或菱状卵形,长4—6厘米,3浅裂,上面被白色柔毛或无毛,下面沿叶脉疏生长硬毛,边缘具细锯齿,叶柄长约10厘米,基部具膨大叶鞘;茎上部叶渐小,具短柄。复伞形花序顶生,花序梗长10—15厘米;总苞片无;伞辐15—18,被毛,长1.5—4厘米,不等长;小总苞片1—2,线形,与花柄近等长;花柄,粗糙,长3—6毫米;花白色;萼齿不显著;花瓣二型;花柱基短圆锥形,柱头短;子房被毛或近于无毛。果实未见。花期7月。

产云南。生长于高山草场。模式标本采自云南丽江。

28. 鹤庆独活(新拟) 白云花(云南)

Heracleum rapula Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, 8(6). 145. 1894.

多年生草本,高80—120厘米。茎圆筒形,有沟纹或棱,从中部分枝,幼时疏生长硬毛,茎下部叶叶片长30厘米,宽25厘米,三出式羽状分裂,裂片有柄,宽卵形,长8—10厘米,宽约8厘米,上面疏生细刚毛,下面淡绿色,沿叶脉被较密的细刚毛,基部心形,边缘具不显著的细锯齿,5浅裂,裂片三角形;叶柄被硬毛,基部椭圆形;茎上部叶逐渐简化,有短柄或无,仅具叶鞘。复伞形花序顶生和侧生;总苞片缺;伞辐20—25;小总苞片4—6,线形,短于花柄;花柄约20,长4—9毫米,粗糙;萼齿细小,不显著;花柱基扁圆锥形;子房疏生短毛。果实倒卵状圆形,长6—7毫米,宽5—6毫米,无毛;棱槽内油管1,其长度为果体长度的3/4,合生面油管2,棒状,胚乳腹面平直。果期10月。

产云南。生长于山坡沟边或稻田地。海拔2000—2200米。模式标本采自鹤庆。

29. 云南独活(新拟)

Heracleum yunnanense Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris 8(6). 143. 1894.

多年生草本,高15—30厘米,有稀疏刚毛。茎分枝,下部叶轮廓披针形,长7.5—12.5