

等各地。

本属模式种：防风 *Stenocoelium divaricatum* Turcz. = *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schisch.

1. 防风(神农本草经) 北防风、关防风(东北); 哲里根呢(内蒙古) 图版 97

Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. in Komarov, Fl. URSS. 17: 54. 1951; 东北药用植物志 145. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 1075. 图 3880. 1972; 东北草本植物志 6: 213. 1977 — *Stenocoelium divaricatum* Turcz. in Flora 17 (Beibl 17): 14. 1834, nom. et Bull. Soc. Nat. Mosc. 17: 734. 1844. — *Siler divaricatum* (Turcz.) Benth. et Hook. f. Gen. pl. 1:909. 1867. — *Ledebouriella seseloides* auct. non Wolff: Kitagawa. Lineam. Fl. Mansh. 338. 1939.

多年生草本，高 30—80 厘米。根粗壮，细长圆柱形，分歧，淡黄棕色。根头处被有纤维状叶残基及明显的环纹。茎单生，自基部分枝较多，斜上升，与主茎近于等长，有细棱，基生叶丛生，有扁长的叶柄，基部有宽叶鞘。叶片卵形或长圆形，长 14—35 厘米，宽 6—8 (—18) 厘米，二回或近于三回羽状分裂，第一回裂片卵形或长圆形，有柄，长 5—8 厘米，第二回裂片下部具短柄，末回裂片狭楔形，长 2.5—5 厘米，宽 1—2.5 厘米。茎生叶与基生叶相似，但较小，顶生叶简化，有宽叶鞘。复伞形花序多数，生于茎和分枝，顶端花序梗长 2—5 厘米；伞辐 5—7，长 3—5 厘米，无毛；小伞形花序有花 4—10；无总苞片；小总苞片 4—6，线形或披针形，先端长，长约 3 毫米，萼齿短三角形；花瓣倒卵形，白色，长约 1.5 毫米，无毛，先端微凹，具内折小舌片。双悬果狭圆形或椭圆形，长 4—5 毫米，宽 2—3 毫米，幼时有疣状突起，成熟时渐平滑；每棱槽内通常有油管 1，合生面油管 2；胚乳腹面平坦。花期 8—9 月，果期 9—10 月。

产黑龙江、吉宁、辽宁、内蒙古、河北、宁夏、甘肃、陕西、山西、山东等省区。生长于草原、丘陵、多砾石山坡。

根供药用，为东北地区著名药材之一。有发汗、祛痰、驱风、发表、镇痛的功效，用于治感冒、头痛、周身关节痛、神经痛等症。

7. 胡萝卜族——DAUCEAE Drude

Drude in Engl. u. Prantl, Pflanzenfam. 3(8):247. 1898.

果实的次棱发达，有皮刺或刺状突起；种子胚乳腹面平直。

我国有胡萝卜属 *Daucus* L.

93. 胡萝卜属——*Daucus* L.

L. Sp. Pl. 1:242. 1753; Gen. Pl. ed. 5. 113. 1754.



防風 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk.: 1. 茎基及根部, 2. 叶片, 3. 果序, 4. 小总苞片, 5. 花及花瓣, 6. 果实, 7. 分生果, 8. 分生果横剖面。(史渭清绘)