

3. 芹亚科——APIOIDEAE Drude

1. 针果芹族——Scandicineae DC.

94 滇藏细叶芹属——*Chaerophyllopsis* de Boiss.

de Boiss. in Bull. Soc. Bot. France **56**: 353. 1909.

细柔直立草本。叶具柄，叶柄基部有叶鞘；叶片羽状分裂，薄膜质，边缘具齿。复伞形花序顶生和侧生，总苞片无或有1片，小总苞数片，狭窄，比花柄短；伞辐多数，开展，近等长；花瓣长圆形，顶端有内曲的小舌片；萼齿披针形，花后宿存，在果实上形成一个副冠；花柱早落，花柱基圆锥形，膜质，上有网纹，宽大，边缘呈轻微的波状。果实很小，线状长圆形，两侧扁压，分生果近圆柱形，表皮光滑，果棱线形突起，5棱等宽；棱槽内油管单生，少有2个的，合生面油管2；心皮柄2裂。

单种属，特产我国西南部云南、西藏。


本属模式种：滇藏细叶芹 *Chaerophyllopsis huai* de Boiss.

1. 滇藏细叶芹 图版 99


Chaerophyllopsis huai de Boiss. in Bull. Soc. Bot. France **56**: 353. 1909; Hiroe, Umbell. Asia **1**: 26. pl. I. fig. 13a, 13b. 1958.

草本，高10—50厘米。下部叶具柄，叶柄长约12厘米，基部有狭窄叶鞘，边缘膜质；叶片轮廓为卵状长圆形，长约10厘米，宽约6厘米，二至多回羽状分裂或全裂，有一回羽片5—6对，下部羽片具长柄，向上渐短至无柄，末回裂片卵形，先端尖锐，基部楔形至截形，边缘具1—2浅裂或深裂状锯齿，锯齿顶端尖锐，上表面绿色，有稀疏鳞片状短毛，下表面浅绿色，叶脉粗，色深而显著，密被白色鳞片状短毛，叶质薄；茎生叶形状与下部相同，叶柄较短，叶鞘较宽；茎顶端叶无柄，仅有较宽的叶鞘。复伞形花序顶生和侧生，花序梗较细柔，有鳞片状毛，伞形花序直径5—6厘米，伞辐18—20，长2—4厘米，近等长，细柔，有鳞片状毛，尤以条棱上毛最多；无总苞片或有1片，每小伞形花序有花10余朵；小总苞数片，线状披针形，比花柄短；花柄密生较长的白色鳞片状毛；花瓣白带粉红，外部有少数短毛；花柱基圆锥形，基部宽大，花柱短，早落；萼齿披针形，宿存。果实很小，线状长圆形，分生果两侧扁压，5条棱显著突起，等宽；棱槽内油管通常为1，有时为2，合生面油管2。花期8—9月，果期9—10月。

产我国西藏(察隅)、云南(宾川)。生长于海拔3600—3800米的高山山沟灌丛和草地。模式标本采自宾川。



滇藏细叶芹 *Chaerophyllopsis huai* de Boiss.: 1.茎下部叶, 2.茎上部叶及花序, 3.花, 4.花瓣, 5.幼果, 6.分生果横剖面。(史渭清绘)



1—5. 中甸东俄芹 *Tongoloo zhongdianensis* S. L. Liou: 1. 植株, 2. 总苞片, 3. 小总苞片, 4. 花, 5. 幼果。6—10. 红脉东俄芹 *Tongoloo rubronervis* S. L. Liou: 6. 植株, 7. 基生叶, 8. 花, 9. 果实, 10. 分生果横剖面。(史渭清绘)