

产云南西北部。生长于海拔 3 500 米左右的高山湿润草地或林下。模式标本采自中甸。

67. 藁本属——*Ligusticum* L.

1. 吉隆藁本(植物分类学报) 图版 110

Ligusticum gyirongense Shan et H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. **24** (4): 315. 1986.

多年生草本,高 30—50 厘米。根圆柱形,伸长;根颈密被纤维状枯萎叶鞘。茎直立,具纵沟纹。基生叶具长柄,柄长 5—12 厘米,基部扩大成鞘;叶片轮廓宽卵形,长 6—10 厘米,宽 7—9 厘米,二回羽状全裂,羽片 4—5 对,疏离,长圆形至长圆状卵形,长 2—5 厘米,宽 1—2 厘米,小羽片卵形至宽卵形,长 1—1.5 厘米,宽 0.5—1 厘米,羽状深裂或 3 浅裂,裂片长圆形至卵形,先端钝圆,具小尖头,茎生叶少,且渐简化。复伞形花序果期直径达 5 厘米;总苞片 5,线形至披针形,长 5—12 毫米,边缘膜质;伞辐 12,长 2—2.5 厘米;小总苞片 5—8,与总苞片同形,长 3—10 毫米;小伞形花序有花 10—15,花瓣倒卵形,白色;萼齿发育,三角形;花柱基圆锥形,花柱 2,向外反曲。分生果长圆状卵形,长约 3 毫米,宽 1.5 毫米,主棱突起成狭翅;每棱槽油管 1—2,合生面油管 2—4;胚乳腹面平直或微凹。果期 10—11 月。


产我国西藏(吉隆)。生长于高山针叶林林缘草地。模式标本采自吉隆县盲木。

本种与辽藁本 *L. jeholense* Nakai et Kitagawa 相似,区别在于本种叶的末回裂片长圆形或卵形,先端钝圆;小总苞片线状披针形;萼齿发育而易区别。

2. 紫色藁本(新拟) 图版 111: 1—5

Ligusticum francheti de Boiss. in Bull. Soc. Bot. France. **53**: 432. 1906. —
Ligusticopsis francheti (de Boiss.) Leute in Ann. Naturhistor. Mus. Wien **73**: 72. 1969.

植株高 20—35 厘米,根圆锥形,表皮棕色。茎单一,暗紫色,具细条纹,无毛,仅上部有 1—2 个分枝。基生叶有柄,长 7—9 厘米;叶鞘长卵形,抱茎;叶片轮廓卵状三角形,三回羽状分裂,第一回羽片 5—6 对,末回裂片披针形,长 3—5 毫米,宽 1—2 毫米,全缘;茎生叶与基生叶同形,茎上部叶较小,无柄;叶鞘卵形,紫红色,边缘膜质;叶片二回羽状分裂。复伞形花序顶生和腋生,无总苞片;伞辐 6—12,近等长,长 1.5—2 厘米,无毛;小伞形花序有多数花,小总苞数片,长于小伞形花序,上部羽状分裂,裂片线形,边缘窄膜质;萼齿线形;花瓣卵形,外表面紫红色,内面白色,基部楔形,顶端渐尖;花柱基短圆锥形,花柱较长,斜升或微向下弯曲。分生果卵形,背腹扁压,背棱和中棱线形突起,侧棱较宽,翅状,背棱槽内有油管 1,中棱槽内有油管 2—3,合生面有油管 6;胚乳腹面平直。花期 8—9



吉隆蒿本 *Ligusticum gyirongense* Shan et H. T. Chang: 1. 植株, 2. 果序, 3. 总苞片, 4. 小总苞片, 5. 果实, 6. 分生果横剖面。 (韦力生绘)