

- 长圆形,长 14—20 厘米,宽 5—7 厘米(广西).....
 2.毛叶单室茱萸 *M. trichophylla* Fang ex Soong
 3.枝、叶均为对生,各部无毛;叶片长圆形或椭圆形,长 8—13 厘米,宽 2.5—6 厘米,先端具长尖尾,长 2—2.5 厘米(云南).....3.长尾单室茱萸 *M. caudatilimba* C. Y. Wu ex Soong

1. 五蕊单室茱萸(新拟)

Mastixia pentandra Blume, Bijdr. 654. 1826; Hook. f. Fl. Brit. India 2: 746. 1879; Wanger. in Engl. Pflanzenreich, 41 (IV. 229): 26. 1910; Matthew in Blumea 23(1): 80. 1976, pro parte, excl. subsp. moluccana.

1a. 五蕊单室茱萸(原亚种)

Mastixia pentandra Blume subsp. ***pentandra***

原亚种产于印度及爪哇,我国无分布。我国仅产下列 2 亚种:

1b. 单室茱萸(亚种)(中国高等植物图鉴)

Mastixia pentandra Blume subsp. ***cambodiana*** (Pierre) Matthew in Blumea, 23(1): 5. fig. 6. 1976. —*M. alternifolia* Merr. in Sunyats. 5: 153. 1940; 中国高等植物图鉴 2: 1108. 图 3946. 1972; 海南植物志: 116. 图 611. 1974; Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 1: 65. 1982.

常绿乔木,高 7—15 米;小枝圆柱状,幼枝紫褐色,老枝灰色或灰黄色。叶互生。革质,干后橄榄色,椭圆形或倒卵长圆形,长 6—11 厘米,宽 2.5—5 厘米,先端急尖,基部楔形,侧脉 3—5 对,向内弯曲,边缘全缘;叶柄长 1.5—2 厘米。圆锥花序顶生,长 4—5 厘米,被微柔毛;小苞片长约 1 毫米,幼时被微被紧贴的短柔毛,后无毛;萼片三角形,较厚;花瓣淡绿色,革质,长圆形,先端微向内折;雄蕊 5,与花瓣互生,花药 2 室;花柱短,锥形,柱头小,子房 1 室;花盘肉质,微 5 裂。核果长圆形,长 1.5—1.7 厘米,顶端有宿存花柱及萼片;种子 1 枚,扁形。花期 5—6 月;果熟期 10 月。

产海南。常生于海拔 350—900 米的密林中。越南及柬埔寨也有分布。

1c. 云南单室茱萸(亚种)(四川大学学报)

Mastixia pentandra Blume subsp. ***chinensis*** (Merr.) Matthew in Blumea 23(1): 83. 1976. —*M. chinensis* Merr. in Sunyats. 3: 256. 1937; Li in Taiwanica 1: 94. 1948; Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 1. 65. 65. 1982.

常绿乔木,高 7 米,稀达 30 米。小枝粗壮,有纵棱,嫩时被紧贴的短柔毛,后无毛。叶互生,革质或近于革质,长圆形或倒卵状长圆形,长 15—20 厘米,宽 4—8 厘米,先端短锐尖,基部阔楔形,上面干后深橄榄色,下面淡黄褐色,侧脉 6—8 对,在上面微显著,下面突出;叶柄长 2—2.5 厘米。顶生圆锥花序长 7—9 厘米;花梗微被紧贴的短柔毛;苞片 2,三角形,外侧被短柔毛,小苞片 1,披针形,外侧被短柔毛;花瓣 5,革质,长圆形,长 1.5 毫米,宽 1 毫米,外侧被疏毛,未开放时先端尖头反折,开放后,先端微向内弯;雄蕊 5,与花