

产四川。常生于海拔 800—1300 米林中,在 1000 米左右的亚热带常绿阔叶林中常组成乔木层片的最低亚层。郁闭度 0.6—0.8,土壤湿润而肥沃,在土层较厚的常绿阔叶林中生长较好。

2. 青木(华北经济植物志要) 东瀛珊瑚(中国树木分类学)

Aucuba japonica Thunb., Nov. Gen. Pl. 3:61.1783 et Fl. Jap. 64. t. 12. 13. 1784; DC. Prodr. 4:274.1830; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23:346. 1886; Schneid. Handb. Laubh. 2:454.1909; Nakai in Bot. Mag. Tokyo, 23:42.1909; Hayata, Fl. Mont. Formos. 111.1909 et Ic. Pl. Formos. 2:63.1912; Wanger. in Engl., Pflanzenreich, 41(IV.229):38.1910; Ohwi, Fl. Jap. 868.1956. — *Eubasis dichotoma* Salisb. Prodr. 68.1796.

2a. 青木(原变种)

Aucuba japonica Thunb. var. *japonica*

常绿灌木,高约 3 米;枝、叶对生。叶革质,长椭圆形,卵状长椭圆形,稀阔披针形,长 8—20 厘米,宽 5—12 厘米,先端渐尖,基部近于圆形或阔楔形,上面亮绿色,下面淡绿色,边缘上段具 2—4(—6) 对疏锯齿或近于全缘。圆锥花序顶生,雄花序长约 7—10 厘米,总梗被毛,小花梗长 3—5 毫米,被毛;花瓣近于卵形或卵状披针形,长 3.5—4.5 毫米,宽 2—2.5 毫米,暗紫色,先端具 0.5 毫米的短尖头,雄蕊长 1.25 毫米;雌花序长 (1—)2—3 厘米,小花梗长 2—3 毫米,被毛,具 2 枚小苞片,子房被疏柔毛,花柱粗壮,柱头偏斜。果卵圆形,暗紫色或黑色,长 2 厘米,直径 5—7 毫米,具种子 1 枚。花期 3—4 月;果期至翌年 4 月。

产浙江南部及台湾*。日本南部、朝鲜也有分布。

本种木材可作手杖、烟管之用。

2b. 花叶青木(变种)(华北经济植物志要) 洒金叶珊瑚(江苏),金沙树(日本)

Aucuba japonica Thunb. var. *variegata* D'ombr. in Fl. Mag. 5:t.277.1866.

本变种的叶片有大小不等的黄色或淡黄色斑点,植株常高 1—1.5 米。易与原变种区别。

我国各大、中城市公园及庭园中均引种栽培为观赏植物。

3. 密花桃叶珊瑚(四川大学学报) 图版 4:3—4

Aucuba confertiflora Fang et Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 1:68 Pl. 3. fig. 1—2.1982.

常绿小乔木,高 2—4 米。枝棕褐色或暗褐色,无毛。叶厚革质,椭圆形或长圆形,长 13—20 厘米,宽 3—5.5 厘米,上面无毛,中脉微下陷,侧脉及网脉均微突出,下面叶脉显著突出,中脉及侧脉上被粗伏毛,其余部分被短柔毛,边缘微反卷,具 5—11 对锯齿;叶柄长

* 现尚未见台湾标本,待以后见到台湾标本再行补充修订。