

2—2.5 厘米,粗壮。雄花序为圆柱状圆锥花序,长 7 厘米,花多而密集,雄花绿色(2 月),花序梗密被黄色柔毛,花梗较短,长仅 1 毫米,密被黄色柔毛;萼片 4,三角卵形,被毛;花瓣 4,长圆形,长 5 毫米,不等大,大者宽 3 毫米,小者宽 1.5 毫米,先端均具短尖头;雄蕊花丝长 3 毫米,花药长 1 毫米;花盘肉质,微 4 裂;雌花序长约 5 厘米,萼片较雄花萼片略长,花瓣未见,子房圆柱状,长 5 毫米,被疏毛,花柱及柱头长仅 1 毫米;花梗长 3 毫米,被粗毛。果未见。花期 2—3 月;果期不明。

产云南东南部。常生于海拔 1000—1550 米林中。模式标本采自云南麻栗坡及广南。

4. 凹脉桃叶珊瑚(四川大学学报) 图版 3:1

Aucuba cavinervis C. Y. Wu ex Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat Sci. ed. 1:69. Pl. 2. fig. 2. 1982.

常绿小乔木,高 1—4 米,枝灰黄色,具纵棱。叶厚革质,长椭圆形,长 7—12 厘米,宽 2—4 厘米,侧脉稀少,仅 3—5 对,在叶上面显著下陷,脉纹未达叶缘即网连如龟甲状,下面脉显著突出,叶面绿色,下面灰绿色,边缘反卷,具腺状细齿。花未见。果梗黄褐色,粗壮,长 1.5 厘米,被微柔毛。果卵形或卵状长圆形,长 1.2—1.5 厘米,直径 7 毫米,无毛。

产云南南部。常生于海拔 1200 米林中。模式标本采自云南麻栗坡。

本种近于桃叶珊瑚 *A. chinensis* Benth., 但叶较短小,侧脉稀少,仅 3—5 对,显著下陷,且网连如龟甲状,叶缘具腺状细齿,易于区别。

5. 枇杷叶珊瑚(中国高等植物图鉴)

Aucuba eriobotryaefolia Wang in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 6(4): 206.1949; 中国高等植物图鉴 2:1112. 图.3954.1972; Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 1:69.1982.——*A. chinensis* Benth. forma. *subintegra* Li in Arn. Arb. 25:310.1944.

乔木,高 8—13 米。幼枝被毛,二年生枝无毛。叶薄革质,椭圆形或倒卵椭圆形,长 12—20 厘米,宽 4—8 厘米,基部圆形,先端具短急尖尾,边缘上段具 4—6 对锯齿,稀近于全缘,上面脉微下陷,无毛,下面中脉上被散生细伏毛。雄花序顶生,长 7 厘米,密被细伏毛或黄色绒毛;小苞片 1 枚,膜质,卵形,萼片小;花瓣长圆形,绿色或淡黄色,长 4—4.5 毫米,宽 1.5—1.9 毫米,先端具短尖头;雄蕊与花瓣近于等长,花药愈合为 1 室;雌花未见。果长卵圆形,被疏伏毛,长 1.4—1.5 厘米,直径 7—8 毫米。花期 1—2 月;果熟期 11—12 月。

产云南西部。生于海拔 1300—1600(—2400)米林中。模式标本采自云南潞西及勐戛。

6. 细齿桃叶珊瑚(四川大学学报) 图版 3:2—6

Aucuba chlorascens Wang in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 6:201.1949; Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci.ed. 1:69.1982.——*A. chinensis* Benth. forma *angustifolia* Rehd. in Sarg., Pl. Wils. 2:573.1916, pro parte; Li in Taiwanica 1:97.