

1948.——*A. chinensis* auct non Benth.: Wanger. in Engl., Pflanzenreich **41**(1V.229): 40.1910, pro parte, quoad specim. Yunnan. Henry 10122, 10123A, 10123B, 13300; Rehd. in Sarg., Pl. Wils. 2:572.1916, pro parte.

常绿灌木或小乔木,高2—7米。叶羊皮纸质,长圆披针形或倒披针形,长5—15厘米,宽1.5—6厘米;下面幼时有细伏毛,后仅中脉及侧脉被疏伏毛,叶上面脉微下陷,下面脉微突出,基部楔形,先端渐尖,边缘微反卷,中段以上具8—14对不明显细齿;叶柄长1—2厘米,基部略膨大,被疏伏毛。雄花序1—3束呈顶生圆锥花序,长5—6厘米;花序轴及花梗均被疏伏毛;雄花绿色,下具1枚膜质苞片,卵状披针形;萼片4齿裂;花瓣卵圆形,长、宽均约为2—2.5毫米,花瓣尖端具尖尾,长约1—1.5毫米,边缘中段以上具腺毛;雄蕊长约1.2毫米;花盘微4裂,肉质;雌花序仅长1—2厘米,花萼、花瓣及花盘近于雄花,花柱粗短,柱头头状,偏斜,子房圆柱状,被细伏毛,花下具2小苞片,线状披针形,被柔毛。果圆柱状,长1.2—1.4厘米,直径8—10毫米,花盘、花柱及柱头、萼齿均宿存于果上。花期2—3月;果熟期10—12月。

产于云南。常生于海拔1400—2800米林中。模式标本采自云南镇康。

7. 粗梗桃叶珊瑚(四川大学学报) 图版4:1—2

Aucuba robusta Fang et Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **1**:70. Pl. 5. fig. 1. 1982.

常绿灌木。枝粗壮,二年生枝灰褐色或灰黄色,被疏毛,叶痕及节上毛较多,一年生枝被毛。叶片纸质,常为长圆形或披针形,稀倒卵长圆形,长10—16厘米,宽2—3.7厘米,先端渐尖,基部阔楔形或楔形,上面深绿色,中脉微下凹,侧脉微突出,下面白绿(采集记录)色,叶脉显著突出,被疏毛;幼叶边缘具细锯齿,二年生叶缘为腺状小齿;叶柄粗壮,长1.5—2厘米,被疏毛。雄花序生于小枝顶端,长2厘米(一月花蕾期),暗紫色,雄花(1月份)萼片呈波状4裂,花瓣卵圆形,长2毫米,宽1.5—1.8毫米,先端尖尾长约1毫米,雄蕊长约1毫米;雌花序未见。果序长约3.5厘米,果梗粗壮,灰黄色,被柔毛,着果处膨大,关节显著;果浅绿色(采集记录),干后暗褐色,长圆形,长约1.2厘米,直径约0.5厘米,近柄处被疏毛,果上宿存萼齿、花柱、微4裂的柱头及环状花盘。花期1—3月;果期翌年1月。


产广西。常生于海拔800—900米的山地沟谷密林中。模式标本采自广西东兰县。

本种近于细齿桃叶珊瑚 *A. chlorascens* Wang, 但本种的小枝及果梗粗壮,灰黄色,特别是着果处膨大,关节显著,花蕾期的花为暗紫色,柱头微4裂。易与之区别。

8. 纤尾桃叶珊瑚(植物分类学报)

Aucuba filicauda Chun et How in Act. Phytotax. Sin., **7**(1):70. pl. 21.1958; Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **1**:69.1982.

8a. 纤尾桃叶珊瑚(原变种) 图版5:1—2



1—2.粗梗桃叶珊瑚 *Aucuba robusta* Fang et Soong: 1. 着果小枝; 2. 叶片。 3—4. 密花桃叶珊瑚 *Aucuba confertiflora* Fang et Soong: 3. 雄花花枝; 4. 幼果序。(胡涛绘)