

仅中脉被短柔毛,边缘具细锯齿 4—7 对。

产四川及湖北西部。常生于海拔 1000 米左右的常绿阔叶林下。模式标本采自四川北碚缙云山。

10. 斑叶珊瑚(四川植物志)

***Aucuba albo-punctifolia*** Wang in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 6(4): 203.1949; 四川植物志 1:393.图版 151.图.1-4.1981; Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 1:71.1982.

10a. 斑叶珊瑚(原变种)

***Aucuba albo-punctifolia*** Wang var. ***albo-punctifolia***

常绿灌木,高 1—2 米,稀为小乔木,高 6(—7) 米;幼枝绿色,老枝黑褐色。叶厚纸质或近于革质,倒卵形,稀长圆形,长 2.5—8 厘米,稀 16 厘米,宽 2—4.5 厘米,上面亮绿色,具白色及淡黄色斑点,下面淡绿色,具小乳突状突起,两面均无毛,叶基部楔形或近于圆形,先端锐尖,长约 5 毫米,叶上面脉微下凹,下面突出;叶柄长 7—20 毫米,幼时散生细伏毛,后无毛。花序为顶生圆锥花序,花深紫色,较稀疏,花梗贴生短毛。果卵圆形,熟后亮红色,长约 9 毫米,直径约 6 毫米,种子 1 枚。花期 3—4 月;果期至翌年 4 月。

产四川、湖北西部及贵州等省。常生于海拔 1300—1800 米林中。模式标本采自四川南川金佛山。

10b. 窄斑叶珊瑚(变种)(四川植物志)

***Aucuba albo-punctifolia*** Wang var. ***angustula*** Fang et Soong, 四川植物志 1:393.图版 151 图.5.1981, et in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 1:71.1982.

本变种的叶窄而长,常为窄披针形,长 11—15 厘米,宽 1.5—3 厘米,叶面常具白色或淡黄色不规则斑点。

产四川及湖南。常生于海拔 1300—2100 米林下。模式标本采自四川南川金佛山。

本变种极近于长叶珊瑚 *Aucuba himalaica* Hook. f. et Thoms. var. *dolichophylla* Fang et Soong, 但本变种叶面具白色及淡黄色不规则的斑点,易于区别。

11. 倒心叶珊瑚(四川大学学报) 图版 2:6—8

***Aucuba obcordata*** (Rehd.) Fu\* in Name list Pl. Hupei. 166. 1964; 四川植物志 1:395.图版 149 图 6-8.1981; Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 1: 71.1982.——*A. chinensis* forma *obcordata* Rehd. in Sarg., Pl. Wils. 2:572.1916; Chien in Sinensia 2:96.1931.——*A. albo-punctifolia* var. *obcordata* (Rehd.) Wang in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 6(4):203.1949.

常绿灌木或小乔木,高 1—4 米。叶厚纸质,稀近于革质,常为倒心脏形或倒卵形,长

\* 傅书遐(中国科学院武汉植物研究所)