

本变种的叶为厚纸质,常为披针形或卵状披针形,长4—10(15)厘米,宽1—4(5)厘米,先端渐尖或锐尖,基部楔形或近于圆形,边缘具钝圆锯齿。易与原变种区别。

产陕西南部、甘肃东南部、四川、贵州、云南等省。常生于海拔1400—1900米林下。模式标本采自四川灌县。

方文培教授曾于1951年在《植物分类学报》发表 *H. chinensis forma megaphylla* Fang (变型),但至今未见到模式标本及照片,也未见到原种区标本,从原描述看,极近于钝齿青荚叶 *H. chinensis var. crenata*,仅叶长达15厘米,宽5厘米。现暂未处理,待以后见到标本再行定夺。

5. 峨眉青荚叶(四川植物志) 峨眉西域青荚叶(植物分类学报)

Helwingia omeiensis (Fang) Hara et Kuros. in Ohashi Fl. E. Himal. 3: 410. fig. 78. a—f. 1975; 四川植物志 1: 381. 图版147. 图1—8. 1981; Soong in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 1: 76. 1982. — *H. himalaica forma omeiensis* Fang in Act. Phytotax. Sin. 1(2): 169. 1951。

5a. 峨眉青荚叶(原变种) 图版12: 1—8

Helwingia omeiensis (Fang) Hara et Kuros. var. ***omeiensis***

常绿小乔木或灌木,高3—4(—8)米;幼枝绿色。叶片革质,倒卵状长圆形、长圆形,稀倒披针形,长9—15厘米,宽3—5厘米,先端急尖或渐尖,具1—1.5厘米的尖尾,基部楔形,边缘除近基部1/3处全缘外,其余均具腺状锯齿,叶面深绿色,干后橄榄色,下面淡绿色,干后有淡黄褐色斑纹,叶脉在叶上面不显,下面微显;叶柄长1—5厘米;托叶2枚,线状披针形或钻形。雄花多枚簇生,常5—20(30)枚成密伞花序或伞形花序;花紫白色,3—5数,小花梗长3—7毫米;雌花1—4(—6)枚,为伞形花序,小花梗长2—4毫米,花绿色,柱头3—4(—5)裂,子房3—4(—5)室。浆果成熟后黑色,常具分核3—4(—5)枚,长椭圆形,长9毫米。花期3—4月;果期7—8月。

产湖北、湖南、广西北部、四川、贵州及云南。常生于海拔600—1700米林中,在海拔800—1300米一带出现频度较大。模式标本采自四川峨眉山。

5b. 长圆青荚叶(变种)(四川植物志) 树花菜(南江) 图版12: 9—11

Helwingia omeiensis (Fang) Hara et kuros. var. ***oblonga*** Fang et Soong, 四川植物志 1: 383. 1981 et in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 1: 76. 1982。

本变种与原变种的区别在于叶片较短,常为长圆形,稀倒卵状长圆形,长(4)6—10(12)厘米,宽1.6—3.2(5)厘米,先端渐尖,基部圆形或阔楔形,边缘锯齿较稀疏,叶柄较粗壮,长5—10毫米。

产陕西南部、甘肃东南部、湖北西部、四川及云南东北部。常生于海拔700—2200米林中,在海拔1000米以下常呈小乔木,在海拔1000米以上,则多呈灌木。模式标本采自四川奉节。