

本变种与钝齿青荚叶 *H. chinensis* Batal. var. *crenata* (Lingelsh. ex Limpr.) Fang 相近,其区别在于叶形不为披针形,边缘锯齿段深而稀疏,决不呈钝圆锯齿,叶片常为革质或近于革质,叶片下面显著呈现黄色斑纹。

4. 鞘柄木属——*Toricellia* DC.

DC. Prodr. 4: 257. 1830; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 952.

1867。

落叶小乔木;枝略粗壮,有明显的叶痕;髓部宽,疏松,白色。叶互生,纸质,阔心形或近于圆形,通常有5枚裂片,稀无裂片,有5—7(—9)条掌状叶脉,边缘全缘或有锯齿;叶柄较长,基部呈鞘状。总状圆锥花序顶生,下垂;花小,单性,雌雄异株,花梗短,有小苞片;雄花的花萼裂片常为5,钝尖或近于锐尖形,通常不整齐;花瓣5,长椭圆形,先端内曲;雄蕊5,花丝短,花药长圆形,2室;花盘扁平;无退化子房或仅在花盘上有1—3枚圆锥状突起;雌花的花萼裂片3—5;无花瓣及雄蕊;花盘不明显;子房椭圆形,3—4室,每室有1枚下垂胚珠,花柱3—4裂。核果小,卵形或斜卵形,紫色或黑色,有宿存的花萼和花柱;种子线形,弯曲,胚细小。

属的模式种: 鞘柄木 *Toricellia tiliifolia* DC.

本属有2种及1变种,产于我国中部至西南部。喜马拉雅东部及中南部也有分布。叶作绿肥用;根和茎皮民间常作药用。

1934年胡先骕教授曾将本属提升为 *Toricelliaceae** (鞘柄木科),仅含 *Toricellia* DC. 1属。1973年 H. K. Airy Shaw 支持了他的意见。在1980年 Takhtajan 的有花植物分类系统中其系统地位被置于 *Griselinaceae* 和 *Helwingiaceae* 之间。

分种检索表

- 1. 叶片无裂片,边缘的粗锯齿有须头…………… 1. 鞘柄木 *T. tiliifolia* DC.
- 1. 叶片有5—7枚裂片,边缘无锯齿…………… 2. 角叶鞘柄木 *T. angulata* Oliv.

1. 鞘柄木(中国高等植物图鉴) 叨里木(中国树木分类学),大接骨(拉汉种子植物称) 图版13: 1—7

Toricellia tiliifolia DC. Prodr. 4: 257. 1830; Seem. in Journ. Bot. 3: 361. t. 41. 1865; C. B. Clarke f. in Hook. f. Brit. Ind. 2: 748 “tiliaefolia”. 1879; Wanger. in Engl., Pflanzenreich, 41(IV. 229): 31. 1910; Rehd. in Sarg., Pl. Wils. 2: 569. 1916.——*Sambucus?* *tiliaefolia* Wall., Cat. 483. 1828, nomen nudum.

落叶小乔木,高3.5—12米;树皮灰黑色;小枝圆柱形,灰绿色,无毛,有不完全的环形叶痕,髓部宽,松软,白色。叶互生,纸质,椭圆状卵形至宽卵形,长10—15厘米,宽8—

* *Toricelliaceae* Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 5(6): 313. 1934.