

本种的幼枝和叶片民间常作为绿肥用。

2b. **有齿鞘柄木**(变种)(四川植物志) 齿叶烂泥树(广西壮族自治区) 图版 13: 9

Toricellia angulata Oliv. var. **intermedia** (Harms) Hu in Journ. Arn. Arb. **13**: 336. 1932; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 685. 1933; Merr. in Journ. Arn. Arb. **20**: 348. 1939; Chun in Sunyats. **4**: 246. 1940; Li in Taiwania **1**: 94. 1948; 四川植物志 **1**: 385. 图版 148. 图 4. 1981. — *T. intermedia* Harms ex Diels in Engl., Bot. Jahrb. **29**: 507(Pl. Central China) 1901; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 526. 1905; Wanger. in Engl., Pflanzenreich, **41**(IV. 229): 33. 1910.

本变种与原变种不同之点在于叶片的裂片边缘有齿牙状锯齿。

产陕西及甘肃南部、湖北西部以及湖南、广西、四川、贵州、云南等省区。常生于海拔 440—1800 米的林下。

本变种的幼枝及叶为绿肥原料；根或茎皮泡酒吃可治跌打损伤。牛马跌断筋骨可用其根及茎皮捣烂包治，故有“接骨丹”之称，此名及图亦见于《植物名实图考》。

5. 灯台树属——**Bothrocaryum** (Koehne) Pojark.

Pojark. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. **12**:

169. 1950. — *Cornus* Sect. *Bothrocaryum* Koehne in Gartenfl. **45**:

285. 1896; Wanger. in Engl., Pflanzenreich, **41** (IV. 229): 49. 1910.

落叶乔木或灌木。冬芽顶生或腋生，卵圆形或圆锥形，无毛。叶互生，纸质或厚纸质，阔卵形至椭圆状卵形，边缘全缘，下面有贴生的短柔毛。伞房状聚伞花序，顶生，无花瓣状总苞片；花小，两性；花萼管状，顶端有齿状裂片 4；花瓣 4，白色，长圆披针形，镊合状排列；雄蕊 4，着生于花盘外侧，花丝线形，花药椭圆形，2 室；花盘褥状；花柱圆柱形，柱头小，头状，子房下位，2 室。核果球形，有种子 2 枚；核骨质，顶端有一个方形孔穴。

属的模式种：灯台树 *Bothrocaryum controversum* (Hemsl.) Pojark. (= *Cornus controversa* Hemsl.)

本属有 2 种，分布于东亚及北美亚热带及北温带地区。我国有 1 种。

1. **灯台树**(四川) 六角树(四川)，端木(经济植物手册) 图版 14: 1—9

Bothrocaryum controversum (Hemsl.) Pojark. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS, **12**: 170 “*controversa*” fig. 1. 1950. — *B. longipetiolatum* (Hayata) Pojark. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS, **12**: 170. 1950. — *Cornus controversa* Hemsl. in Kew Bull. 331. 1909; Hemsl. ex Prain in Bot. Mag. **125**: ad t. 8261. 1909; Koehne in Mitteil. Deutsch. Dendr. Ges. **18**: 185. 1909; Wanger. in Engl., Pflanzenreich, **41**(IV. 229): 49. fig. 12. p—q. & 14. c—d. 1910; Rehd. in Sarg., Pl. Wils., **2**: 573. 1916; Merr. et Chun in Sunyats. **1**: 76. 1963; Li, Woody Fl.