

brescens Fang et W. K. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **3**: 156. Pl. 2. 2. 1980.

本变种与原变种的区别在于叶为长圆形，稀近于披针形，较小，长约7—9厘米，宽3—5厘米，两面均无毛。

产云南东北部和西北部。生于海拔1500—3400米的疏林内或灌丛中。模式标本采自云南独龙江河谷。

组 3. 黑果组——Sect. 3. *Nigrae* (Koehne) W. K. Hu in Bull. Bot. Res. **4**(3) 102. 1984.——*Cornus* Subsect. (III) *Nigrae* Koehne in Mitteil. Deutsch. Dendr. Ges **12**: 44. 1903; Wanger. in Engl., Pflanzenreich, **41**(IV. 229): 64. 1910.

核果成熟时黑色；叶纸质，椭圆或卵形；柱头头状，上面平坦而略下陷或多少呈盘状。


3. 小花栎木 (中国高等植物图鉴) 贵州四照花 (中国树木分类学) 图版 17: 1—5

Swida parviflora (Chien) Holub in Folia Geobot. et Phytotax., Praha, **2**: 427. 1967.——*Cornus parviflora* Chien in Sinensia **2**: 95. fig. 1. 1932; 中国高等植物图鉴 **2**: 1102. 图 3933. 1972.

乔木或灌木，高3—8米；树皮黄褐色；幼枝纤细，圆柱形，略具棱角，稀被灰白色贴生短柔毛，老枝灰褐色，疏生黄褐色皮孔。冬芽顶生或腋生，狭圆锥形，长2—5.5毫米，被灰白色贴生短柔毛。叶对生或近于对生，纸质，长椭圆形，长4—6.5厘米，宽1.6—3.3厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部楔形或宽楔形，全缘，上面绿色，下面淡绿色，均稀被淡白色贴生短柔毛，中脉在两面稍凸起，侧脉3—4对，弓形内弯，在上面稍显明，下面略微凸起；叶柄细圆柱形，长3—5毫米，幼时密被淡白色贴生短柔毛，上面有浅沟，下面圆形。伞房状聚伞花序顶生，宽4—12厘米，有时有一枚披针形或卵状披针形的叶状苞片；总花梗细圆柱形，长1—4厘米，近于无毛；花小，白色，直径4.5毫米；花萼裂片4，宽三角形，长0.3—0.4毫米，稍长于花盘，内侧无毛，外侧仅基部有灰白色贴生短柔毛；花瓣4，长圆披针形或舌状长圆形，长2.5毫米，宽近1毫米，先端渐尖，上面无毛，下面稀被白色贴生短柔毛；雄蕊4，长2.3毫米，略短于花瓣，花丝线形，无毛，长约2毫米，花药2室，狭倒卵形，长1.3毫米，丁字形着生；花盘垫状、厚约0.3毫米，有白色短柔毛；花柱圆柱形，长近2毫米，略有浅沟，疏被白色贴生短柔毛，柱头小，点状，子房下位，花托倒圆锥形至倒卵形，长1毫米，直径约1毫米，密被淡白色贴生短柔毛；花梗圆柱形，长0.3—2毫米，被灰白色短柔毛。核果狭倒卵形或近于长圆形，长5—6毫米，直径约4毫米。花期7月；果期8—9月。

产广西西北部和贵州中南部至东北部。生于海拔330—2500米的森林中或岩石上。模式标本采自贵州都匀。

4. 樟叶栎木 (新拟) 图版 17: 6—8



1—5. 小花楝木 *Swida parviflora* (Chien) Holub: 1. 着花枝; 2. 花; 3. 花瓣; 4. 花折去花瓣及雄蕊示花托、花萼裂片、花盘和柱头; 5. 果实放大。6—8. 樟叶楝木 *Swida oligophlebia* (Merr.) W. K. Hu: 6. 着花枝; 7. 花折去花瓣及雄蕊示花托、花萼裂片、花盘和柱头; 8. 果实。(冯先洁绘)