

W. K. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **3**: 159. Pl. 6. 1. 1980.

本变种与原变种的区别在于叶片较大而近于圆形,长约 11—13 厘米,宽 8—10 厘米,下面无乳头状突起,沿脉密被黄色短柔毛,侧脉 7—8 对,在下面凸出,横生细脉通常显明;花序较长,常被黄色短柔毛,花较大,花瓣舌状披针形,长 5.2 毫米,宽 1.7 毫米,雄蕊比花瓣短,花柱长 4 毫米。

产云南西北部的维西县。生于海拔 2770 米的森林中。

14c. **粗壮曲瓣栎木**(变种)(四川大学学报) 图版 25: 1—3

Swida monbeigii (Hemsl.) Sojak var. **crassa** (Fang et W. K. Hu) Fang et W. K. Hu in Bull. Bot. Res. **4**(3): 105. 1984.——*Cornu smonbeigii* Hemsl. subsp. *crassa* Fang et W. K. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **3**: 158. Pl. 5. 1. 1980.

本变种与原变种的区别在于小枝和花序轴黄褐色,比较粗壮,叶片较大,近于圆形,长 11—12 厘米,宽 7—10 厘米,侧脉 8—9 对,在上面下凹,下面显著,总果梗长 5 厘米,果梗长 6 毫米。

产四川西部荣经县下天池林中。

14d. **杨叶曲瓣栎木**(变种)(四川大学学报) 图版 25: 4—6

Swida monbeigii (Hemsl.) Sojak var. **populifolia** (Fang et W. K. Hu) Fang et W. K. Hu in Bull. Bot. Res. **4**(3): 105. 1984.——*Cornus monbeigii* Hemsl. subsp. *populifolia* Fang et W. K. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **3**: 159. Pl. 5. 2. 1980.

本变种与原变种的区别在于叶片较大,为长圆椭圆形,长 10—13 厘米,宽 5—7 厘米,基部近于圆形,先端急尖或近于渐尖,下面淡白色,无乳头状突起,沿脉有密生的黄色短柔毛,侧脉 7—8 对,在上面凹下,在下面凸出;叶柄长 2—3(—4) 厘米;花序包括 5 厘米长的总梗在内长 8 厘米,宽 10 厘米,花瓣狭披针形,长 3.8—4 毫米,宽 0.7—0.9 毫米,花柱长 3.5—4 毫米。

产云南和西藏边界地区。生于海拔 2700—3000 米的林下。模式标本采自西藏东部察瓦龙的督拉。

15. **卷毛栎木**(四川植物志) 西蜀栎木(拉藻种子植物名称),川鄂栎木(经济植物手册)

Swida ulotricha (Schneid. et Wanger.) Sojak in Novit. Bot. & Del. Sem. Hort. Bot. Univ. Carol. Prag. 11. 1960.——*Cornus ulotricha* Schneid. et Wanger. in Fedde, Repert., Sp Nov. **7**: 228. 1909; Wanger. in Engl., Pflanzenreich, **41**(IV. 229): 65. 1910; Rehd. in Sarg., Pl. Wils. **2**: 574. 1916; 四川植物志 **1**: 335. 图版 127. 图 1—4. 1981.

15a. **卷毛栎木**(原变种) 图版 26: 1—4