

Swida ulotricha (Schneid. et Wanger.) Sojak var. **ulotricha**

乔木,稀灌木,高(1.5—)7—15(—20)米;当年生枝红褐色,疏被贴生短柔毛,老枝黄褐色,无毛,具有近于环形的微凸叶痕。冬芽尖圆锥形,长5—12毫米,被灰色及棕色短柔毛。叶对生,纸质,阔卵形至宽椭圆形,长9—15厘米,宽3—8.5厘米,尤以花序下的一对叶片为大,先端突尖,基部圆形,有时稍不对称,边缘微波状,上面深绿色,有散生平贴短柔毛,下面灰色,有不明显的乳头状突起及白色平贴短柔毛,有时尚具有黄色卷曲毛,中脉在上面稍显明,下面凸出,侧脉6—7对,弓形内弯,沿叶脉密生黄褐色卷曲毛;叶柄细圆柱形,长1.6—2.8厘米,幼时被灰色短柔毛,老时呈淡黄绿色,近于无毛,上面有浅沟,下面圆形。顶生宽伞房状聚伞花序,长5—8厘米,宽8—12厘米,分枝略呈弓形,疏被灰色平贴短柔毛及微曲短柔毛;总花梗圆柱形,长2—3.2厘米,略有稜角,疏被短柔毛或近于无毛;花小,白色,直径6—8毫米;花萼裂片4,宽三角形,长0.3—0.4毫米,与花盘等长或稍短于花盘,外侧被灰白色短柔毛;花瓣4,舌状长圆形,长4毫米,宽1.1—1.8毫米,先端钝尖或渐尖,质地略厚,上面无毛,下面有灰白色平贴短柔毛;雄蕊4,与花瓣等长,花丝线形,无毛,长3.6—3.8毫米,花药长圆卵形,黄色,长1.4—1.5毫米,丁字形着生;花盘垫状,厚约0.3—0.4毫米,上面略有短柔毛;花柱圆柱形,长3毫米,疏被平贴短柔毛,柱头头状,子房下位,花托倒卵形或倒圆锥形,长1.8毫米,直径1.4毫米,密被灰白色贴生短柔毛;花梗较短,长约0.3—2毫米,疏生灰白色短柔毛。核果近于球形,直径4.3—4.5毫米,蓝黑色,疏被淡白色贴生短柔毛;核骨质,近于球形,直径约3—4毫米。花期5—6月;果期7—8月。

产陕西西南部、甘肃、河南西部、湖北西部以及四川、贵州和云南等省。生于海拔850—2650米的沟边或杂木林中。模式标本采自湖北西部。

15b. **薄叶卷毛栎木**(变种)(西藏植物名录)

Swida ulotricha (Schneid. et Wanger.) Sojak var. **leptophylla** W. K. Hu in Bull. Bot. Res. 4(3):106. Pl. 1984.

本变种与原变种的区别是小乔木,高4—8米,叶为薄纸质,宽长圆形,长10—17.5厘米,宽4—8厘米。

产西藏东南部的察隅县扎拉桥附近。生于海拔2250米的山沟杂木林中。

16. **康定栎木**(中国高等植物图鉴)

Swida schindleri (Wanger.) Sojak in Novit. Bot. & Del. Sem. Hort. Bot. Univ. Carol. Prag. 11. 1960.—*Cornus schindleri* Wanger. in Fedde, Repert, Sp. Nov. 4: 337. 1907 et in Engl., Pflanzenreich, 41(IV. 229): 67. fig. F-K. 1910; 中国高等植物图鉴 2: 1105. 图 3939. 1972, pro parte; 四川植物志 1: 337. 图版 128. 1—5. 1981.

16a. **康定栎木**(原变种) 图版 27: 1—5

Swida schindleri (Wanger.) Sojak var. **schindleri**