

- 疏被柔毛.....11.城口桫叶树 *C. fargesii* Franch.
- 16.萼片长卵形,长2—3毫米,短尖头,叶片长圆形,基部楔形,侧脉18—25对,花瓣内则无毛
.....13.壮丽桫叶树 *C. magnifica* Fang et L. C. Hu
- 3.花梗在花期短于萼片或与萼近于等长,花瓣顶端啮蚀状或流苏状,花序分枝成圆锥花序或伞形花序;落叶或常绿。
- 17.花药倒卵形,萼片长卵形或卵状长圆形,长2—3毫米;花序分枝成圆锥花序或近于伞形花序,极稀单一。
- 18.叶革质或近革质,半常绿,椭圆形或长圆形,老时两面无毛或仅于下面沿中脉疏被长柔毛,侧脉8—12(—17)对,细网脉仅于下面明显;花梗长2—3毫米,子房密被锈色分节长硬毛
.....14.华南桫叶树 *C. faberi* Hance
- 18.叶纸质,脱落,卵状椭圆形,老时上面无毛,下面沿中脉疏被长柔毛,侧脉16—18对,细网脉在两面微突而显著;花梗长1—2毫米,子房密被锈色星状绒毛及微硬毛
.....15.短柄桫叶树 *C. brachypoda* L. C. Hu
- 17.花药倒心脏形,萼片长圆卵形或卵形。
- 19.花序成伞形花序,花序轴及花梗粗壮,花梗长2—3(—4)毫米;萼片长圆卵形,长3—4毫米,雄蕊伸出;叶纸质,脱落,通常长圆状椭圆形或卵状椭圆形,老时上面无毛,下面沿中脉和侧脉被密或稀疏星状柔毛及单长毛.....16.贵州桫叶树 *C. kaipoensis* Lévl.
- 19.花序成圆锥花序,花序轴及花梗细瘦,花梗长1—2毫米,雄蕊内藏;叶近革质,常绿,椭圆状长圆形或椭圆形,老时上面无毛,下面全被稠密灰白色伏贴细星状绒毛.....17.白背桫叶树 *C. petelotii* P. Dop et Y. Trochain

1.单毛桫叶树(云南植物志) 小山柳(广西植物名录),单柱山柳(海南植物志),单毛山柳(中国高等植物图鉴)

Clethra bodinieri Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 10: 475. 1912 et Fl. Kouy-Tchéou 147. 1914; Hand. -Mazz. in Sinensia 5: 3. 1934; Reh d. in Journ. Arn. Arb. 15: 267. 1934 et ibid. 18: 228. 1937; Sleum. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 38: 206. 1935 (sub *C. longibracteata*) et in Bot. Jahrb. 87: 62. 1967; Merr. et Chun in Sunyatsensia, 5: 156. 1940; S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 41: 179. 1960, incl. var. *latifolia* S. Y. Hu ibid. 179 et var. *parvifolia* S. Y. Hu ibid. 180;海南植物志 3: 141, 图 633. 1974 及 var. *latifolia* S. Y. Hu; 中国高等植物图鉴 3: 4, 图 3962. 1974; Chamb. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 35: 256. 1977; 云南植物志 2: 517. 1979; L. C. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 3: 106. 1979.

1 a. 单毛桫叶树(原变种) 图版 44: 1—5

Clethra bodinieri Lévl. var. *bodinieri*.

常绿灌木或小乔木,高2—5米;小枝细瘦,圆柱形,嫩时无毛或有稀疏平展灰色单伏毛,老时无毛。叶革质或近革质,披针形或椭圆形,稀为倒卵状长圆形,长5—9(—11.5)