

3: 107. 1979.

灌木,高2—5米;小枝纤细,圆柱形,微具条纹,嫩时密被平展单伏毛,老枝灰褐色或深褐色,无毛。叶厚纸质或近革质,披针形,稀为长圆形,长5—9厘米,宽1.5—2(—2.5)厘米,先端渐尖,基部窄楔形,上面深绿色,无毛,下面粉绿色,沿中脉及侧脉略被贴生疏柔毛,侧脉的腋内有少数白色髯毛,其余部分无毛,但在放大镜下观察有小圆形腺点,边缘上半部具稀疏小锯齿,下半部全缘;中脉在上面下凹,下面凸起,侧脉7—9对,近边缘处微弯与细脉相结合,在上面不明显而微下凹,下面显著突起;叶柄长5—8毫米,初被平展疏柔毛,其后近于无毛。总状花序单一,长8—14厘米,花序轴和花梗均密被淡褐色单伏毛;苞片披针形,先端尾状渐尖,长约4毫米,易落;花梗在花期长3—5毫米,果时向上开展,长6—10毫米;萼5深裂,裂片长圆卵形,长3毫米,宽1.5毫米,短尖头,外具肋,密被紧贴的星状绒毛及短伏毛,缘具纤毛;花瓣5,粉红色,长圆形,长7毫米,宽2—3毫米,具清晰的脉纹,顶端近于圆形,有小尖头,有时稍成浅啮蚀状,内侧有长髯毛,外侧无毛,边缘两侧有短纤毛;雄蕊10,与花瓣近相等或稍长,花丝长5毫米,密被稍卷曲的长柔毛,花药倒箭头形,长2.5—3毫米;子房密被绢状微硬毛,花柱不分裂,长6毫米,近基部被疏柔毛,顶端柱头3,点状。蒴果近球形,直径约3—5毫米,密被短柔毛及稀疏微硬毛,宿存花柱长7—8毫米,顶端极短的3裂;种子黄褐色,卵圆形,有时具棱,长约1.5毫米,种皮上有明显的网状浅凹槽。花期6—8月;果期9—11月。

产广西(平南、昭平、大瑶山、阳朔、永福)。生于海拔580—1100米的山坡丛林中。模式标本采自广西阳朔。

本种与单毛桫叶树 *C. bodinieri* Lév. 近似,但本种的叶下面粉绿色,在放大镜下观察,有小圆形腺点,花粉红色,花柱基部有疏柔毛,顶端柱头3个,可以区别。

3. 云南桫叶树 (云南植物志) 云南山柳(中国树木分类学), 滇西山柳(中国高等植物图鉴)

Clethra delavayi Franch. in Journ. de Bot. **9**: 370. 1895; Stapf in Curtis's Bot. Mag. 148, t. 8970. 1923; Bean, Trees & Shrubs **3**: 101. 1922 et ed. 7. 464. 1950, t. 27; 陈嵘, 中国树木分类学 942. 1937; Rehd. Bibl. Cult. Trees & Shrubs 502. 1949 et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 2 impr. 5, 690. 1951; S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. **41**: 181. 1960, incl. var. *glabra* S. Y. Hu ibid. 182; Sleum. in Bot. Jahrb. **87**: 64. 1967, pro parte; 中国高等植物图鉴 **3**: 5, 图 3964. 1974; 云南植物志 **2**: 517. 1979; L. C. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **3**: 108. 1979. — *C. euosmoda* Dop in Bull. Hist. Toulouse **58**: 146. 1929 et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine **3**: 715. 1930. — *C. monostachya* auct. non Rehd. et Wils.: S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. **41**: 180. 1960, pro parte, quoad specim. cit. R. C. Ching 21452.

3 a. 云南桫叶树(原变种) 图版 46: 1—4