

1—1.5 毫米,种皮上有网状浅凹槽。花期 7—8 月;果期 9—10 月。

产江西(铜鼓、修水)、湖北西南及西部、湖南、四川东部及东南部 and 贵州(印江)。生于海拔 700—2100 米的山地疏林及灌丛中。特产我国。模式标本采自四川城口。

12. 武夷桫欏叶树 (四川大学学报)

Clethra wuyishanica Ching ex L. C. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 3: 118. 1979.

12 a. 武夷桫欏叶树 (原变种) 图版 54: 1—3

Clethra wuyishanica Ching ex L. C. Hu var. *wuyishanica*

灌木,高 1.5 米;小枝具细棱纹,嫩时密被红褐色成簇细星状绒毛,老枝灰褐色,无毛。芽卵圆形,顶端尖,长约 7 毫米,鳞片披针形,密被绢状小伏毛。叶纸质,卵状长圆形或长圆状椭圆形,长 5—11 厘米,宽 2—4 厘米,先端长渐尖,基部楔形,两侧稍不对称,嫩时上面疏被星状绒毛,其后变为无毛,下面沿中脉及侧脉被小伏毛及星状绒毛,其后仅沿中脉疏被小伏毛,侧脉腋内有白色髯毛,边缘具锐尖锯齿,齿尖刺状,基部 $1/3—1/4$ 部分全缘,中脉在上面下凹,下面凸起,侧脉 12—13 对,在上面平坦,下面微凸,细网脉仅于下面显著;叶柄长 10—27 毫米,上面略成浅沟状,最初密被后疏被星状绒毛;下面圆形,初被星状绒毛及小伏毛,其后疏被小伏毛。总状花序 2—4 枝,成近伞形圆锥花序,长 14—20 厘米;花序轴和花梗均密被灰黄色星状及成簇微硬毛;苞片早落;花梗在花期长 3—6 毫米;萼 5 深裂,裂片卵形,长 2—2.5 毫米,宽约 1.5 毫米,钝尖头,密被黄褐色星状绒毛及成簇的短微硬毛,边缘具纤毛,花瓣 5,白色,长圆形或倒卵状长圆形,长 3.5—4 毫米,宽 1.5—2 毫米,顶端微缺,成不明显浅啮蚀状,两面无毛;雄蕊 10,花丝长 3—3.5 毫米,无毛,稀被稀少长柔毛,花药长圆倒卵形,长 1.5 毫米,基部短尖;子房密被灰黄色绢状长伏毛,花柱紫褐色,长 3 毫米,基部有微硬毛,顶端 3 裂。花期 7 月。

产江西(铜鼓)、福建南部。生于海拔 760—1100 米的路边、林缘或山沟小溪旁。模式标本采自福建崇安。

本种与城口桫欏叶树 *C. fargesii* Franch. 极为相近,唯本种的花较小,萼片卵形,钝尖头,花瓣无毛,顶端成不明显的浅啮蚀状,雄蕊花丝通常无毛,花药长圆倒卵形,花柱基部有微硬毛,可以区别。

12 b. 蚀瓣桫欏叶树 (变种) (四川大学学报) 图版 54: 4—6

Clethra wuyishanica Ching ex L. C. Hu var. *erosa* L. C. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. 3: 118. 1979.

本变种与原变种的区别在于叶片卵状椭圆形,边缘具粗尖锯齿,花序 3 枝,近于圆锥状,花瓣顶端成明显的啮蚀状,子房疏被绢状短微硬毛,花柱无毛,顶端极短 3 裂。

产江西。生于海拔 400 米的山地密林中。模式标本采自江西武宁。

13. 壮丽桫欏叶树 (四川大学学报)