

Clethra faberi Hance var. **laxiflora** Fang et L. C. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **3**: 120. 1979.

本变种与原变种的区别在于叶片厚纸质,卵状长圆形,花小,排列稀疏,花瓣长3毫米,内侧近基部疏被3—5行白色疏柔毛。

14 c. **短梗华南桫欏叶树** (变种)(四川大学学报) 图版 57: 2

Clethra faberi Hance var. **brevipes** L. C. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **3**: 120. 1979.

本变种与原变种的区别在于叶片长圆形或倒卵状长圆形,先端长渐尖,基部楔形,果序常单生,较短,长12—14厘米,苞片宿存,果径2—2.5毫米,果梗长2毫米。

产广西西部。生于海拔900米的林中。模式标本采自广西隆林。

15. **短柄桫欏叶树** (四川大学学报) 图版 56: 5—9

Clethra brachypoda L. C. Hu in Journ. Sichuan Univ., Nat. Sci. ed. **3**: 121. 1979.

灌木;小枝圆柱形,具浅棱纹,嫩时密被黄褐色星状细绒毛并杂有单柔毛,老枝灰黑色,无毛。叶纸质,卵状椭圆形或长圆形,长5—8厘米,宽2—3厘米,先端尾状渐尖,基部楔形,干后上面深褐色,无毛,下面淡褐色,沿中脉疏被疏柔毛,侧脉腋内有白色髯毛,其余部分无毛,边缘具锐尖锯齿,基部1/4部分全缘,中脉在上面下凹,下面凸起,侧脉16—18对,细网脉在两面微突而显著;叶柄长5—10毫米,初密被后疏被平展疏柔毛。总状花序2—5枝成丛状或近于伞形状,极稀单生;花序轴和花梗均密被锈色星状绒毛及杂于其中密或稀疏成簇微硬毛;有时杂有单长毛;苞片线状披针形,长4毫米,早落;花梗在花期长1—2毫米;萼5深裂,裂片长卵形,长2—3毫米,短尖或近于渐尖头,1—3肋,密被锈色星状绒毛;花瓣5,白色,倒卵状长圆形,长3.5毫米,顶端稍成不明显的浅啮蚀状,内侧近基部疏被紧贴短柔毛,外侧沿中脉疏被紧贴长柔毛;雄蕊10,花丝疏被稀少疏柔毛或变为无毛,花药倒卵形,长1毫米,基部锐尖,顶端叉分;子房密被锈色星状绒毛及绢状微硬毛,花柱紫黑色,长约2.5毫米,无毛,顶端短3裂。花期7月。

产湖北西部。生于山坡上。模式标本采自湖北兴山。

本种近于华南桫欏叶树 *C. faberi* Hance, 但叶片纸质,卵状椭圆形或长圆形,较短小,边缘具锐尖锯齿,侧脉16—18对,干后细网脉在两面微突而显著。花梗短,仅长1—2毫米,花丝疏被稀少疏柔毛或变为无毛,子房密被锈色星状绒毛及成簇微硬毛,可以区别。

16. **贵州桫欏叶树** (四川大学学报) 嘉宝山柳(广西植物名录), 正安山柳(拉汉种子植物名称), 大叶山柳(中国高等植物图鉴)。

Clethra kaipoensis Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **10**: 475. 1912 et Fl. Kouy-Tchéou 147. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **15**: 268. 1934 et ibid. **18**: 228. 1937; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 760. 1936; S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. **41**: 188.



1—4. 华南柃叶树 (原变种) *Clethra faberi* Hance var. *faberi*: 1. 着花枝; 2. 花; 3. 雌蕊;
4. 花瓣及雄蕊。5—9. 短柄柃叶树 *Clethra brachypoda* L. C. Hu: 5. 着花枝; 6. 花蕾; 7. 雄蕊内侧;
8. 花瓣外侧; 9. 花瓣内侧。(冯先洁绘)