

较小,长 1—1.6 厘米,宽 1—1.2 厘米,下面苍白色;萼片为三角状卵形,容易与我国其他各种鹿蹄草区别。

5. 贵阳鹿蹄草 (中国高等植物图鉴) 柯氏鹿蹄草 (拉汉种子植物名称)

Pyrola corbieri Lévl. in Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. **12**: 254. 1903; H. Andr. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **64**: 252. 1914; id. in Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**(4): 765. 1936; 中国高等植物图鉴 **3**: 743. 1974.

常绿草本状半小灌木,高 15—30 厘米;根茎细长,横生,斜升,有分枝。叶 2—6,基生,薄革质,长圆形或长圆状卵形,长 (2.5—)3—6.5 (—7.5) 厘米,宽 (1.5—2—4.5 (—5) 厘米,先端钝头,稀急尖,基部渐狭下延于叶柄,边缘近全缘或有疏小齿,上面绿色,下面带紫色;叶柄长 4—8 厘米。花葶较粗壮,直径约 2 毫米,有狭翅,有 1—2 枚褐色鳞片状叶,狭条形,长 1—1.5 厘米,先端渐尖或近急尖,基部稍抱花葶。总状花序长 3—10 厘米,有 4—8 花,花倾斜,下垂,较大,宽碗形,花冠外面褐紫色;花梗长 5—8 毫米,腋间有膜质苞片,狭披针形,长 5—8 毫米,与花梗近等长或稍长,先端渐尖;萼片长圆形,长 2.5—3 毫米,宽 1.5—2 毫米,先端钝头或急尖,长约为花瓣的 1/3;花瓣倒卵圆形或近圆形,长 5—7 毫米,宽 4—5 毫米;雄蕊 10,花丝无毛,花药红色;花柱长 5—7 毫米,倾斜,上部稍弯曲,顶端有环状突起,不伸出花冠或稍伸出,近果期伸长至 8—10 毫米,柱头 5 圆裂。蒴果扁球形,直径 6—8 毫米。花期 7—8 月;果期 9—10 月。

产广西、贵州、四川。生于海拔 1000—3000 米之山地林下。模式标本采自贵州贵阳。

本种分布不甚普遍,与普通鹿蹄草 *P. decorata* H. Andr. 相近,但花冠外面为褐紫色,花药红色,同时花柱不伸出花冠或稍外露(这一点与小叶鹿蹄草 *P. media* Sw. 相似),容易区别。

6. 兴安鹿蹄草 (中国东北部植物检索表) 图版 61: 5—8

Pyrola dahurica (H. Andr.) Kom. in Act. Hort. Petrop. **39**: 96. 1923 (ut *davurica*); Nakai in Journ. Jap. Bot. **15**: 744. 1939; Ворошилов, Фл Совет. Дальн. Вост. 328. 1966; Kitag. Neo-Lineam. Fl. Mansh. 494. 1979. — *P. americana* Sw. *D. dahurica* H. Andr. in Deutsch. Bot. Monatschr. **22**: 50. 1911. — *P. rotundifolia* subsp. *dahurica* (H. Andr.) H. Andr. in Oesterr. Bot. Zeitsch. **64**: 233. 1941. — *P. japonica* auct. non Klenze nec Sieb.: Yamatuta, List Manch. Pl. 213. 1930. — *P. dahurica* H. Andr. apud. Kom. et Alis. Key Pl. Far. East. Reg. USSR **2**: 833. 1932. — *P. incarnata* Fisch. ex DC. subsp. *dahurica* (H. Andr.) Křisa, Novit. Bot. Instit. Bot. Univ. Carol. Prag. **1667**: 31. 1967; id. in Bot. Jahrb. **89**: 66. 1969; id. in Bot. Jahrb. **90**(4): 459, 500. 1971; Czerepanov, Addit. et Corr. ad Fl. URSS 476. 1973. — *P. rotundifolia* auct. non Linn: Kom. in Act. Hort. Petrop. **25**: 194 (Fl. Mansh. III). 1905, pro parte; Kitag. in Rep. Inst. Sci. Res. Manch. **3**(App. 1):