

1. 花柱短于花冠; 花冠长1.5—3厘米; 叶长1—2厘米。

2. 花冠玫瑰红色; 花冠筒内面有短柔毛; 叶下鳞片相距为其直径

..... 37. 树生杜鹃 *R. dendrocharis* Franch.

2. 花冠白色; 花冠筒内面无毛; 叶下鳞片彼此邻接

36. 宝兴杜鹃 (中国高等植物图鉴) 图版 12: 1—3

Rhododendron moupinense Franch. in Bull. Soc. Bot. France, **33**: 237. 1886; Hemsl. et Wils. in Kew Bull. **1910**: 115. 1910; Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. **1**: 525. 1913; Hutch. in Curtis's Bot. Mag. **141**: t. 8598. 1915; id. in Stevenson, Spec. Rhodod. 505. 1930; Fang in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. Ser. **12**: 75. 1939; 中国高等植物图鉴 **3**: 45. 图 4044. 1974; Cullen in Not. Bot. Gard. Edinb. **39**: 58. 1980; Davidian, Rhodod. Spec. **1**: 290. t. 26. 1982; 云南植物志 **4**: 520. 1986; 中国四川杜鹃花 191. 1986; 贵州植物志 **3**: 203. 1990.


灌木, 有时附生, 高1—1.5米。枝条开展, 幼枝有鳞片, 密被褐色刚毛, 老枝无毛。叶芽鳞倒卵形, 早落。叶聚生枝条上部, 近假轮生, 叶片革质, 长圆状椭圆形或卵状椭圆形, 长2—4 (—6) 厘米, 宽1.2—2.3 (—4) 厘米, 两端钝, 顶端有钝的小短尖头, 边缘通常反卷, 具缘毛, 以后无毛, 上面除中脉近叶基部被褐色短硬毛外, 其余无毛, 下面略灰白色, 密被褐色鳞片, 鳞片小, 略不等大, 相距为其直径或相互邻接, 中脉在上面明显下陷, 下面凸起, 侧脉在两面不显; 叶柄长3—7毫米, 密被褐色刚毛。花序顶生, 1—2花伞形着生; 花梗长5—7毫米, 被鳞片, 被短柔毛或刚毛, 有时近无毛; 花萼5裂, 裂片长圆形或卵圆形, 长2—4毫米, 下部连合, 外面被鳞片, 具缘毛; 花冠宽漏斗状, 长约4厘米, 白色或带淡红色, 内有红色斑点, 外面洁净; 雄蕊10, 不等长, 长2—3厘米, 短于花冠, 花丝下部有开展的白色柔毛; 子房5室, 密被鳞片, 花柱伸出, 略长于花冠, 洁净。蒴果卵形, 长1.5—2.3厘米, 被宿存萼。花期4—5月, 果期7—10月。

产四川东南至中西部、贵州 (梵净山)、云南东北部。通常附生于林中树上, 或生于岩石上, 海拔1900—2000米。模式标本采自四川宝兴。

37. 树生杜鹃 (中国高等植物图鉴)

Rhododendron dendrocharis Franch. in Bull. Soc. Bot. France, **33**: 233. 1886; Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. **1**: 525. 1913; Hutch. in Stevenson. Spec. Rhodod. 503. 1930; Fang in Contr. Lab. Sci. Soc. China Bot. **12**: 74. 1939; id., Icon. Pl. Omei. **1** (1): Pl. 33. 1942; id. in R. H. S. Rhodod. Year Book, **2**: 122. 1947; 中国高等植物图鉴 **3**: 45. 1974; Cullen in Not. Bot. Gard. Edinb. **39**: 58. 1980; Davidian. Rhodod. Spec. **1**: 290. 1982; 中国四川杜鹃花 188. 1986.

灌木, 通常附生, 高50—70厘米。分枝细短, 密集, 幼枝有鳞片, 密生棕色刚毛。



图版 12 1—3. 宝兴杜鹃 *Rhododendron moupinense* Franch.: 1. 果枝; 2. 叶上面观; 3. 部分叶下面示鳞片。
4—6. 饰石杜鹃 *Rhododendron petrocharis* Diels: 4. 花枝; 5. 叶上面观; 6. 部分叶下面示鳞片。(吴锡麟绘)