

(7—) 8—10 (—12) 毫米, 外面被淡白色鳞片; 雄蕊 (8—) 10, 不等长, 花丝基部被毛; 子房长 (1.5—) 2—2.5 毫米, 基部有狭的柔毛带, 上部密被淡色鳞片, 花柱长 12—17 毫米, 常较雄蕊长, 基部被短柔毛和少数鳞片。蒴果卵圆形, 长约 5 毫米, 密被鳞片。花期 5—6 月, 果期 7—9 月。

产西藏东南部、西南部及南部。生于桦木林、针-阔叶混交林下、灌丛中、开阔的林地及林缘, 海拔 2 900—3 900 米。模式标本采自米林鲁霞。

106. 草原杜鹃 (中国四川杜鹃花) 豆叶杜鹃 (云南植物志)

Rhododendron telmateium Balf. f. et W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **9**: 279. 1916; Hutch. in Stevenson, Spec. Rhodod. 431. 1930; Philipson et M. N. Philipson in Not. Bot. Edinb. **34**: 47. 1975; Cullen in ibid. **39**: 104. 1980; Davidian, Rhodod. Spec. **1**: 210. 1982; 云南植物志 **4**: 512. 图版 143, 1—4. 1986; 中国四川杜鹃花 290. 1986; 横断山区维管植物下册 1437. 1994. ——*R. diacritum* Balf. f. et W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **9**: 225. 1916. ——*R. drumonium* Balf. f. et W. W. Smith in ibid. **9**: 226. 1916. ——*R. idoneum* Balf. f. et W. W. Smith in ibid. **9**: 237. 1916. ——*R. pycnocladum* Balf. f. et W. W. Smith in ibid. **9**: 267. 1916.

小灌木, 高 (0.1—) 1 米, 分枝细瘦, 多而密集常成垫状。当年枝密被褐色鳞片。叶芽鳞脱落。叶聚生于枝端或沿小枝散生, 叶片披针形、狭椭圆形、宽椭圆形、长卵圆形或圆形, 长 3—12 (—14) 毫米, 宽 1.5—5 (—6.5) 毫米, 顶端急尖至近圆形, 具硬的小短尖头, 边缘常浅波状, 基部楔形, 上面暗灰绿色, 有时有光泽, 密被重叠的淡金黄色鳞片, 下面金黄褐色、淡橙色、棕色或赤褐色, 密被重叠的两色鳞片, 或罕单色, 大多数鳞片淡黄至赤褐色, 混杂有少数至多数暗褐至近黑褐色鳞片; 叶柄长 0.3—3 毫米, 密被鳞片。花序顶生, 伞形, 具 1—2 (3) 花; 花芽鳞脱落或宿存; 花梗长 0.5—1.5 (—2) 毫米, 被鳞片, 有时有微柔毛; 萼长 0.5—2 (—3) 毫米, 带红紫色或淡绿色, 裂片披针形、三角形、卵形至圆形, 常不等大, 被淡色鳞片, 边缘被鳞片, 有或无长缘毛; 花冠宽漏斗状, 长 (6—) 7—11 (—14) 毫米, 淡紫色、玫瑰红色至深蓝紫色, 花管长 2—4 毫米, 喉部被短柔毛, 通常外面也有, 并被疏或密的淡色鳞片, 雄蕊 (8—) 10 (11) 枚, 长度多变, 多少与花冠等长, 花丝在基部被白色短柔毛; 子房长 1.5—2.5 (—3) 毫米, 被淡黄色鳞片, 基部有一窄的短柔毛带, 花柱长 3—17 毫米, 较雄蕊短、相等或较长, 基部无毛或有毛, 有时具少数鳞片, 柱头截形或盘状。蒴果卵圆形至长圆形, 长 3—4 毫米, 被鳞片。花期 5—6 (7) 月, 果期 8—10 月。

产云南西北部、北部及中部和四川西部及西南部。生于林缘、杜鹃灌丛、高山草地或岩坡, 海拔 (2 700—) 3 200—3 800 (—5 000) 米。模式标本采自云南中甸高原山区。