

亚组 13. 照山白亚组 Subsect. *Micrantha* (Hutch.) Sleumer in Bot. Jahrb. **74**: 533. 1949. —Ser. *Micranthum* sensu Hutch. in Stevenson, Spec. Rhodod. 500. 1930.

灌木，高可达 3 米。枝纤细，被鳞片。叶常绿，下面密被鳞片，或被不明显的蛛丝状毛。花序顶生，总状，多花，具有一明显的花序轴；花冠钟状，白色或黄色，外面被鳞片；雄蕊 10，不等长；子房 5 室，密被鳞片，花柱伸直。蒴果小型，被鳞片。种子具突出的翅和鳍棱。

亚组的模式种：照山白 *Rhododendron micranthum* Turcz.

本亚组共 3 种，分布于我国和朝鲜。我国均产。

分种检索表

1. 花冠白色。
 2. 叶下面有不明显的蛛丝状毛被，叶较大，长 9—12.5 厘米；花冠长 1.2 厘米…………… 128. 短尾杜鹃 *R. brevipendulum* R. C. Fang et S. S. Chang
 2. 叶下面无毛，叶较小，长(1.5—)3—5 厘米；花冠较小，长 4—8 毫米…………… 129. 照山白 *R. micranthum* Turcz.
1. 花冠黄色…………… 130. 辽西杜鹃 *R. liaoxiense* S. L. Tung et Z. Lu


128. 短尾杜鹃 (云南植物研究) 图版 32: 6—12

Rhododendron brevipendulum R. C. Fang et S. S. Chang in Act. Bot. Yunn. **10**: 369. f. 1. 1988; 贵州植物志 **3**: 203. 1990.

常绿灌木，高 2—3 米。幼枝密被鳞片。叶披针状长圆形，长 9—12.5 厘米，宽 2.5—3.5 厘米，顶端短尾状渐尖，基部近圆形，上面疏被不久脱落的鳞片，下面密被鳞片，鳞片小，相接近或相距几为其直径，并有不明显的蛛丝状毛被，中脉在上面下陷，在下面突起，侧脉约 15 对，稍突起；叶柄长 0.8—1.4 厘米，密被鳞片。花序顶生，总状，多花，花序轴长 6—8 毫米，花期后伸长至 2 厘米，密被鳞片；花梗长 5—8 毫米，密被鳞片；花萼 5 裂，裂片卵形或三角状卵形，长 1.5—3 毫米，外面密被鳞片，被缘毛；花冠管状钟形，长 1.2 厘米，白色，外面密被鳞片，内面达管部被柔毛，花管较裂片长 2 倍，裂片长圆形；雄蕊 10，不等长，几与花冠等长或较短，花丝达中部被毛；子房 5 室，密被鳞片，花柱无毛，较雄蕊短。蒴果长圆形，长 0.6—1.1 厘米，密被鳞片。花期 4—6 月，果期 9—10 月。

产贵州南部、东部。生于林中或谷地，海拔 1 450—1 950 米。模式标本采自凯里(雷公山)。

129. 照山白 (中国高等植物图鉴) 图版 32: 1—5



图版 32 1—5. 照山白 *Rhododendron micranthum* Turcz.: 1. 花枝; 2. 花; 3. 雌蕊; 4. 雄蕊; 5. 果。6—12. 短尾杜鹃 *Rhododendron brevicaudatum* R. C. Fang et S. S. Chang: 6. 花枝; 7. 花纵剖面; 8. 雌蕊; 9. 雄蕊; 10. 叶下面示鳞片及毛被; 11. 果; 12. 种子。(王金凤绘)