

月，果期 11 月。

产广东西南部和广西东部。生于海拔约 1 000—1 350 米的森林中。模式标本采自广东信宜。

9. 卧龙杜鹃 (植物分类学报)

Rhododendron wolongense W. K. Hu in *Rhodod. Not. et Recor.* 2: 29. f. 1. 1985 et *Act. Phytotax. Sin.* 26: 303. f. 2. 1988.

小乔木，高 4—6 米；树皮淡褐色；小枝绿色，有明显近于圆形的叶痕，在花序下小枝直径 7 毫米。叶革质，狭长圆形，稀长圆状倒披针形，长 14—17.5 厘米，宽 3—4.5 厘米，先端钝，基部圆形或近心形，不对称，边缘微反卷，上面绿色，下面粉白色，无毛，中脉在上面凹下，下面隆起，侧脉 21—25 对；叶柄长 1.6—2.1 厘米，淡黄绿色，无毛。顶生短总状伞形花序，有花 5—6 朵；总轴长约 2 厘米；花梗长 1.8—2 厘米，均疏被腺体；花萼小，长约 1.5—2 毫米，外面有稀疏的腺体，先端有 5—6 枚齿状裂片；花冠漏斗状钟形，长 9.5—10.5 厘米，直径 7.5—8.5 厘米，白色，外面近基部有稀疏的腺体，内面疏生白色微柔毛，裂片 7，宽卵形，长近 3 厘米，宽 2.5 厘米，顶端无缺刻；雄蕊 15，不等长，长 5.7—7.5 厘米，花丝白色，下部渐宽，有白色微柔毛，花药狭椭圆形，黄色，长 4—5 毫米；子房卵状圆锥形，顶端截形，长 7.5 毫米，直径 4 毫米，密被淡红褐色短柄腺体，花柱长 8.8 厘米，全被淡红褐色短柄腺体，柱头盘状，宽 5 毫米。果未见。花期 7 月。

产四川西北部。生于海拔 1 700 米的山谷阔叶林中。模式标本采自四川汶川卧龙自然保护区。

本种的叶为狭长圆形；顶生短总状伞形花序有花 5—6 朵；花冠长达 9.5—10.5 厘米；雄蕊 15 枚，花丝基部有白色微柔毛，易于识别。

10. 大白杜鹃 (中国高等植物图鉴) 大白花杜鹃 (云南植物志)

Rhododendron decorum Franch. in *Bull. Soc. Bot. France* 33: 230. 1886 et *Pl. Davidian.* 2: 83. 1888; Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 26: 22. 1889; Diels in *Engler's Bot. Jahrb.* 29: 511. 1900; Rehd. et Wils. in *Sargent, Pl. Wils.* 1: 541. 1913; Hutch. in *Curtis's Bot. Mag.* 142: t. 8659. 1916; Tagg in *Stevenson, Spec. Rhodod.* 269. 1930; Rehd. in *Journ. Arn. Arb.* 15: 270. 1934; Hand.-Mazz. *Symb. Sin.* 7: 1936; 中国高等植物图鉴 3: 101. 图 4155. 1974; Chamb. in *Not. Bot. Gard. Edinb.* 35: 259. 1977 et in *ibid.* 39: 230. 1982; Cullen et Chamb. in *Not. Bot. Gard. Edinb.* 37: 330. 1979; 云南植物志 4: 364. 1986; 峨眉山杜鹃花 42. 图 13. 1986; 中国四川植物花 24—25. 1986. — *R. franchetianum* Lév. in *Bull. Soc. Agric. Sarthe* 39: 45. 1903. et *Cat. Pl. Yunn.* 91. 1916. — *R. spooneri* Hemsl. et Wils. in *Kew Bull. Misc. Inform.* 1910: 110. 1910. — *R. albicaule* Lév. in *Fedde, Repert. Sp. Nov.* 13: 148. 1914. — *R. giraudiasii* Lév.