

体；花萼小，碟形，长约 1.5 毫米，肉质，被微柔毛，裂齿 5，圆形或近三角形，边缘有细毛；花冠管状钟形，长 2.2—2.9 厘米，直径 2.3—3.2 厘米，淡蔷薇色，内面基部有 5 枚深红色的蜜腺囊，裂片 5，圆形，长 7—10 毫米，有缺刻；雄蕊 10，不等长，长 8—14（—20）毫米，花丝白色，基部有微柔毛；子房圆锥形，长约 3 毫米，密被丛卷毛状绒毛及少数有柄腺体，花柱长 1.5 厘米，无毛。果未见。花期 7 月。

产云南西北部和西藏东南部。生于海拔 3 900—4 260 米的石山草地或陡岩上。模式标本采自云南德钦。

233. 华丽杜鹃 (云南植物研究) 真红杜鹃 (云南杜鹃花)

Rhododendron eudoxum Balf. f. et Forrest in Not. Bot. Gard. Edinb. 11: 62. 1919; Tagg in Stevenson, Spec. Rhodod. 548. 1930; Hand.—Mazz. Symb. Sin. 7: 784. 1936; Cullen et Chamb. in Not. Bot. Gard. Edinb. 37: 332. 1979; Chamb. in Not. Bot. Gard. Edinb. 39: 401. 1982; 西藏植物志 3: 588. 1986; 云南植物志 4: 439. 1986. — *R. trichomiscum* Balf. f. et Forrest in ibid. 12: 169. 1920. — *R. trichophlebium* Balf. f. et Forrest in ibid. 12: 62. 1920; Tagg in ibid. 558. 1930. — *R. eudoxum* Balf. f. et Forrest subsp. *trichomiscum* (Balf. f. et Forrest) Tagg in ibid. 549. 1930. — *R. fulvastrum* Balf. f. et Forrest subsp. *trichomiscum* (Balf. f. et Forrest) Cowan in Not. Bot. Gard. Edinb. 20: 79. 1940. — *R. fulvastrum* Balf. f. et Forrest subsp. *trichophlebium* (Balf. f. et Forrest) Cowan in ibid. 20: 79. 1940. — *R. temenium* Balf. f. et Forrest subsp. *albipetalum* Cowan in ibid. 20: 83. 1940. — *R. temenium* Balf. f. et Forrest subsp. *rhodanthum* Cowan in ibid. 20: 81. 1940.

233a. 华丽杜鹃 (原变种) 图版 108: 1—4

Rhododendron eudoxum Balf. f. et Forrest var. *eudoxum*

灌木，高 0.3—1.2（—1.8）米；树皮灰褐色，片状剥落；幼枝具柔毛，有散生细柔的刚毛，花序下小枝直径 2.2—2.4 毫米，老枝灰色，有明显的叶痕。叶革质，长椭圆形或长圆状倒卵形，长 2.3—3 厘米，宽 8—14 毫米，先端圆或钝，有小尖头，基部楔形，边缘反卷，上面绿色，下面淡黄绿色，有薄的毛被，在脉上具灰白色的丛卷毛，中脉在上面凹下，下面凸出，侧脉 7—9 对；叶柄长约 2—3 毫米，略被灰白色丛卷毛及少数细刚毛。顶生伞形花序有花 3—5（—10）朵；花梗长 1—1.2 厘米，密被棕红色丛卷毛及少数有柄腺体；花萼小，杯状，长约 1.5 毫米，外面疏具腺毛，裂齿波状，边缘有腺毛；花冠管状钟形，长 2.5 厘米，宽 2.7 厘米，深红色，内面下部有白色微柔毛，基部有 5 枚黑红色的蜜腺囊，裂片 5，圆形，长 1.1 厘米，顶端有浅缺刻；雄蕊 10，不等长，长 1—1.6 厘米，花丝近于无毛，花药长圆形，淡黄褐色，长 1.7—2 毫米；子房卵圆形，长 3.4—4 毫米，密被长腺毛及少数绒毛，花柱长 2.8 厘米，无毛，柱头头状，宽约 2.3 毫米。蒴果圆柱形，褐色，长约 1.2 厘米，有腺毛残迹。花期 6—11 月，果期 10—11 月。