

2(1): 99. 1982. syn. nov.

252a. 马银花 (原变种) 图版 114: 1—3

*Rhododendron ovatum* (Lindl.) Planch. ex Maxim. var. *ovatum*

常绿灌木，高 2—4 (—6) 米；小枝灰褐色，疏被具柄腺体和短柔毛。叶革质，卵形或椭圆状卵形，长 3.5—5 厘米，宽 1.9—2.5 厘米，先端急尖或钝，具短尖头，基部圆形，稀宽楔形，上面深绿色，有光泽，中脉和细脉凸出，沿中脉被短柔毛，下面仅中脉凸出，侧脉和细脉不明显，无毛；叶柄长 8 毫米，具狭翅，被短柔毛。花芽圆锥状，具鳞片数枚，外面的鳞片三角形，内面的鳞片长圆状倒卵形，长 1 厘米，宽 0.8 厘米，先端钝或圆形，边缘反卷，具细睫毛，外面被短柔毛。花单生枝顶叶腋；花梗长 0.8—1.8 厘米，密被灰褐色短柔毛和短柄腺毛；花萼 5 深裂，裂片卵形或长卵形，长 4—5 毫米，宽 3—4 毫米；外面基部密被灰褐色短柔毛和疏腺毛，边缘无毛；花冠淡紫色、紫色或粉红色，辐状，5 深裂，裂片长圆状倒卵形或阔倒卵形，长 1.6—2.3 厘米，内面具粉红色斑点，外面无毛，筒部内面被短柔毛；雄蕊 5，不等长，稍比花冠短，长 1.5—2.1 厘米，花丝扁平，中部以下被柔毛；子房卵球形，密被短腺毛；花柱长 2.4 厘米，伸出花冠外，无毛。蒴果阔卵球形，长 8 毫米，直径 6 毫米，密被灰褐色短柔毛和疏腺体，且为增大而宿存的花萼所包围。花期 4—5 月，果期 7—10 月。

产江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川和贵州。生于海拔 1000 米以下的灌丛中。模式标本采自福建厦门。

本种在广西作药用，用根与水、酒、肉同煎，白糖冲服，可治白带下黄浊水。

谭沛祥发表的尖萼杜鹃 *R. ovatum* (Lindl.) Planch. ex Maxim. var. *prismatum* Tam, 作者看了沈绍金采自江西庐山 175 号模式标本的特征，认为与原种区别甚微，故合并。

252b. 刚毛马银花 (变种) (四川大学学报自然科学版)

*Rhododendron ovatum* (Lindl.) Planch. ex Maxim. var. *setuliferum* M. Y. He in Journ. Sichuan Univ. Nat. Sci. ed. 1984(1): 96. 1984.

与原变种的区别在于叶系椭圆形或长圆状椭圆形，花柱近基部密被细刚毛。

产浙江、江西、福建。生于海拔 350—800 米的山地灌丛或疏林中。模式标本采自浙江杭州。

253. 头巾马银花 (新拟) 头巾杜鹃 (植物研究)

*Rhododendron mitriforme* Tam in Bull. Bot. Res. 2(4): 91. 1982; 华南杜鹃花志 67, 111. 图 22—1. 1983. — *R. xinganense* G. Z. Li in Guihaia 3(2): 83—85. 1983, pro parte, quoad Specim. cit. Y. K. Lee 401563, 401015, 401354, 401288, C. K. Tsiang 263.

253a. 头巾马银花 (原变种) 图版 114: 5—6