

..... 260. 泰顺杜鹃 *R. taishunense* B. Y. Ding et Y. Y. Fang

4. 叶柄长约1厘米;发育的花萼裂片线形,长达1.7厘米,边缘被灰白色腺毛;花冠长5—5.7厘米;蒴果先端截平..... 261. 长蒴杜鹃 *R. stenaulum* Balf. f. et W. W. Smith

3. 花芽鳞片仅边缘和顶端被柔毛。

5. 花序呈伞形状,具花数朵。

6. 雄蕊伸出于花冠外很长,花白色,有时蔷薇色.....

..... 262. 长蕊杜鹃 *R. stamineum* Franch.

6. 雄蕊等于或短于花冠。

7. 花萼裂片不明显;花冠淡紫色、粉红色或淡红白色.....

..... 263. 毛棉杜鹃花 *R. moulmainsense* Hook. f.

7. 花萼裂片长线形或线状钻形。

8. 叶柄无毛。

9. 发育的花萼裂片长线形,先端钝或二叉状,边缘具流苏状睫毛.....

..... 264. 横县杜鹃 *R. linearicupulare* Tam

9. 发育的花萼裂片呈宽线形,长达1.7厘米;蒴果长9—10厘米.....

..... 265. 凯里杜鹃 *R. kailiense* Fang et M. Y. He

8. 叶柄被疏刚毛和短柔毛,发育的花萼裂片为线状钻形,边缘篦齿状和疏生短刚毛;花冠白色至淡黄色..... 266. 大鳞杜鹃 *R. huguangense* Tam

5. 花序具花1—2朵。

10. 叶卵状椭圆形或长圆披针形,长5—8厘米,宽2.5—5.5厘米;芽鳞边缘具微柔毛或细腺点;花粉红色..... 267. 鹿角杜鹃 *R. latoucheae* Franch.

10. 叶狭椭圆状披针形或倒披针形,长7—11.2厘米,宽1.4—3厘米;芽鳞边缘具细睫毛;花粉红色至白色..... 268. 西施花 *R. ellipticum* Maxim.

2. 花梗和子房密被短柔毛(至少幼时如此)。

11. 叶两面无毛。

12. 叶倒披针形;花序具花数朵;花梗上的毛不易脱落;花冠裂片长圆状披针形,具条纹.....

..... 269. 多花杜鹃 *R. cavaleriei* Lévl.

12. 叶倒卵形或长圆状倒披针形;花序仅具花1朵;花梗上的毛易脱落;花冠裂片阔倒卵形或卵状椭圆形,其基部具1黄色小斑..... 270. 滇南杜鹃 *R. hancockii* Hemsl.

11. 叶下面散生短刚毛,狭倒披针形或长圆状披针形;花序具花1—3朵.....

..... 271. 香缇树杜鹃 *R. tutcheriae* Hemsl. et Wils.

1. 花梗和子房密被腺头刚毛。

16. 幼枝、叶柄及叶片下面中脉被疏刚毛或腺头刚毛;花冠淡紫色或粉红色,长4.5—5厘米.....

..... 272. 弯蒴杜鹃 *R. henryi* Hance

16. 幼枝、叶柄及叶的两面均密被刚毛或腺头刚毛;花冠白色或淡红色,长5—6厘米.....

..... 273. 刺毛杜鹃 *R. championae* Hook.

260. 泰顺杜鹃 (植物研究)

Rhododendron taishunense B. Y. Ding et Y. Y. Fang in Bull. Bot. Res. 7(2):

1—2. f. 1. 1987.

常绿灌木或小乔木,高2—5米;枝圆柱形,顶端具刚毛。叶3—4片集生枝顶,近于轮生,革质,椭圆状长圆形或长圆状披针形,长3.5—9厘米,宽1.2—3.2厘米,先端渐尖或尾状渐尖,基部心形,微反卷,有刺状锯齿或刺毛,中脉在上面下凹,下面凸出,侧

脉9—12对，下面不明显，除下面中脉具刺毛外，两面无毛；叶柄长2—5毫米，密被刺毛。花单生枝顶叶腋；花梗长8—15毫米，无毛；花萼小，长约2毫米，5浅裂，裂片钝三角形，无毛；花冠淡紫红色，狭漏斗状，长3.2—4厘米，裂片5，椭圆状长圆形，长2—2.5厘米，无毛；雄蕊10，不等长，长1.5—3厘米，花丝基部被柔毛；子房圆柱形，长约6毫米，花柱微伸出花冠外，无毛。蒴果圆柱形，长4—4.5厘米，直径约4毫米。

花期4月，果期9—11月。

产浙江南部。生于海拔400—600米的山坡常绿阔叶林中。模式标本采自浙江泰顺县里光乡黄石坑。

本种与刺毛杜鹃 *R. championae* Hook. 相近，但本种的叶较小，长3.5—9厘米，宽1.2—3.2厘米；叶柄长2—5毫米；花梗、花萼及子房均无毛；花冠长不足4厘米，易于区别。

261. 长蒴杜鹃 (云南种子植物名录) 图版 117: 1—4

Rhododendron stenaulum Balf. f. et W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 10: 157. 1917; Hutch. in Stevenson, Spec. Rhodod. 624. 1930; 云南植物志 4: 544. 1986. — *R. mackenzianum* Forrest in Not. Bot. Gard. Edinb. 12: 132. 1920.

常绿灌木，高3（—9）米；幼枝细长，干后淡红褐色，无毛或具疏刚毛，老枝灰褐色，无毛。叶厚纸质，近于轮生，长圆形或长圆状披针形，长8—14厘米，宽2.5—4厘米，先端渐尖或斜渐尖，呈弯拱状尾尖，基部楔形，边缘微反卷，上面绿色，下面淡白色，中脉在上面凹陷，下面凸出，侧脉10—15（—20）对，于两面明显，未达叶缘连结，细脉在下面明显，两面无毛；叶柄长约1厘米，无毛或具疏刚毛。花芽长卵形，外面鳞片被灰白色短柔毛。花芳香，单生枝顶叶腋，每枝顶端簇生花3—5朵；花梗长1.5厘米，无毛；花萼不发育或1—2裂片呈线形，膜质，长达1.7厘米，宽0.5毫米，边缘被灰白色腺毛；花冠白色或洋红紫色，狭漏斗状钟形，长5—5.7厘米，直径5厘米，5裂，裂片阔卵形，长2.5—2.7厘米，基部具斑纹，花冠管长2.5厘米，向基部渐狭，两面无毛；雄蕊9—10，不等长，内藏，花丝基部近于无毛；子房圆柱形，长7毫米，干后黑色，无毛，花柱长4厘米，比花冠短，无毛。蒴果圆柱形，长达6厘米，直径4毫米，先端截平，花柱宿存。花期4月，果期11月。

产云南西部和西北部。生于海拔2000—2700米的灌丛中。也分布于缅甸东北部。模式标本采自云南保山。

本种的幼枝、叶柄具疏刚毛；花大，单生枝顶叶腋；雄蕊和花柱内藏；芽鳞外面被灰白色柔毛。蒴果圆柱形，先端截平，易与其他种相区别。

262. 长蕊杜鹃 (峨眉植物图志)

Rhododendron stamineum Franch. in Bull. Soc. Bot. France, 33: 236. 1886; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 29. 1889; Hutch. in Stevenson, Spec. Rhodod. 623. 1930; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 273. 1934; Hand.—Mazz.