

263. 毛棉杜鹃花 (海南植物志) 白杜鹃 (广西植物名录), 丝线吊芙蓉 (中国高等植物图鉴) 图版 118: 1—5

*Rhododendron moulmainsense* Hook. f. in Curtis's in Bot. Mag. 82: t. 4904. 1856; Hutch. in Stevenson, Spec. Rhodod. 620. 1930; 海南植物志 3: 143. 1974; M. N. Philip. et W. R. Philip. in Not. Bot. Gard. Edinb. 40: 226. 1982; 华南杜鹃花志 78. 1983; 云南植物志 4: 543. 图版 154: 1—3. 1986. — *R. westlandii* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 31. 1889; Wils. in Journ. Arn. Arb. 6: 168. 1925; Hutch. in ibid. 626. 1930; 中国高等植物图鉴 3: 158. 图 4269. 1974. — *R. oxyphyllum* Franch. in Journ. de Bot. 12: 264. 1898; in ibid. 621. 1930. — *R. siamense* Diels in Fedde, Repert. Spec. Nov. 4: 289. 1907. — *R. leucobotrys* Ridl. in Journ. Fed. Mal. States Mus., 4: 43. 1909. — *R. klossii* Ridl. in ibid. — *R. nematocalyx* Balf. f. et W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 10: 124. 1917.

灌木或小乔木, 高 2—4 (—8) 米; 幼枝粗壮, 淡紫褐色, 无毛, 老枝褐色或灰褐色。叶厚革质, 集生枝端, 近于轮生, 长圆状披针形或椭圆状披针形, 长 5—12 厘米, 稀达 26 厘米, 宽 2.5—8 厘米, 先端渐尖至短渐尖, 基部楔形或宽楔形, 边缘反卷, 上面深绿色, 叶脉凹陷, 下面淡黄白色或苍白色, 中脉凸出, 侧脉于叶缘不连结, 两面无毛; 叶柄粗壮, 长 1.5—2.2 厘米, 无毛。花芽长圆锥状卵形, 鳞片阔卵形或长倒卵形, 两面无毛或外面近顶部被微柔毛, 边缘被柔毛。数伞形花序生枝顶叶腋, 每花序有花 3—5 朵; 花梗长 1—2 厘米, 无毛; 花萼小, 裂片 5, 波状浅裂, 无毛。花冠淡紫色, 粉红色或淡红白色, 狭漏斗形, 长 4.5—5.5 厘米, 5 深裂, 裂片开展, 匙形或长倒卵形, 顶端浑圆或微凸起, 花冠管长 2—2.5 厘米, 基部直径 3—4 毫米, 向上扩大; 雄蕊 10, 不等长, 长 4.1—4.7 厘米, 略比花冠短, 花丝扁平, 中部以下被银白色糠皮状柔毛; 子房长圆筒形, 长约 1 厘米, 微具纵沟, 深褐色, 无毛; 花柱稍长过雄蕊, 但常比花冠短, 无毛。蒴果圆柱状, 长 3.5—6 厘米, 直径 4—6 毫米, 先端渐尖, 花柱宿存。花期 4—5 月, 果期 7—12 月。

产江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州和云南。生于海拔 700—1500 米的灌丛或疏林中; 中南半岛、印度尼西亚也有分布。

本种与长蕊杜鹃 *R. stamineum* Franch. 相似, 但本种的雄蕊与花冠等长或微比花冠短, 易于区别。

南亚杜鹃花 *R. klossii* Ridl. 未见模式标本, 仅根据 Hutch. in Stevenson, Spec. Rhodod. 620. 1930 的意见列为本种之异名。

264. 横县杜鹃 (新拟) 线萼杜鹃 (华南杜鹃花志和广西植物)

*Rhododendron linearicupulare* Tam. Survey Rhodod. South China 112. f. 15. 1983 et in Guizhou 3(3): 183. f. 5. 1983.



图版 118 1—5. 毛棉杜鹃花 *Rhododendron moultmainense* Hook. f.: 1. 花枝; 2. 花冠剖面; 3. 雌蕊; 4. 雄蕊; 5. 果实。6—8. 大鳞杜鹃 *Rhododendron huguangense* Tam: 6. 叶片, 示叶柄被刚毛; 7. 花芽呈圆球状; 8. 鳞片示边缘具腺齿和顶端的毛。(冯先洁绘)