

68. 幼枝被开展的疏柔毛状糙伏毛; 花冠玫瑰色, 长2.8—3.4厘米; 花柱近基部疏被糙伏毛 ..... 344. 蔗黄杜鹃 *R. spadiceum* Tam
68. 幼枝被平贴糙伏毛。
69. 花冠红色或粉红色, 长约2厘米; 花柱长2.4—2.9厘米, 近基部被糙伏毛。
70. 叶长卵形或椭圆状长卵形, 长4—6 (—14) 厘米, 宽1.5—3 (—7.5) 厘米, 基部近圆形 ..... 345. 河边杜鹃 *R. flumineum* Fang et M. Y. He
70. 叶倒卵形或倒卵状椭圆形, 稀狭椭圆形, 长2.5—3.5厘米, 宽常2—2.5厘米, 基部楔形或狭楔形, 上面干后秆黄色 ..... 346. 腊黄杜鹃 *R. subcerinum* Tam
69. 花冠淡红紫色, 长约3.5厘米; 花柱长4.2厘米, 基部疏被糙伏毛; 叶披针形或长圆状披针形 ..... 347. 忍冬杜鹃 *R. loniceraeflorum* Tam
56. 花柱比部分雄蕊长, 伸出冠外; 叶椭圆状长卵形, 长2—5.5 (—10) 厘米, 宽0.8—1.9 (—4.8) 厘米; 花冠连同管长8毫米, 雄蕊比花冠长; 花柱与部分雄蕊等长, 长1.2厘米, 中部以下被糙伏毛 ..... 348. 细瘦杜鹃 *R. tenue* Ching ex Fang et M. Y. He

278. 台北杜鹃 (中国高等植物图鉴) 甘奈海杜鹃 (中国植物学会杂志), 乌来杜鹃 (台湾植物志) 图版 123: 6—9

*Rhododendron kanahirai* Wils. in Wils. et Rehd., Monog. Azal. 28. 1921 et in Journ. Arn. Arb. 6: 182. 1925; Rehd. in Stevenson, Spec. Rhodod. 85. 1930; Fang in Journ. Bot. Soc. China 2(2): 608. 1935; 中国高等植物图鉴 3: 146. 图 4245. 1974; 台湾植物志 4: 27. 1978.

落叶灌木, 高1—3米; 分枝繁多, 幼枝纤细, 密被栗褐色扁平糙伏毛, 老枝黑褐色, 有残存毛。叶线状披针形或线状倒披针形至倒卵形, 长1.5—4.8厘米, 宽0.2—1.5厘米, 先端钝尖, 具短尖头, 基部渐狭, 边缘微反卷, 全缘或不明显的圆锯齿, 被糙伏毛, 上面深绿色, 下面苍白色, 中脉和侧脉在上面凹陷, 下面凸出, 两面散生亮栗褐色糙伏毛; 叶柄长1—3毫米, 密被栗褐色糙伏毛。花芽卵球状, 鳞片阔卵形, 外面沿中脉被刚毛, 边缘具纤毛。花1—3朵生枝顶; 花梗长3—6毫米, 直立, 密被栗褐色扁平糙伏毛; 花萼裂片5, 卵形至椭圆形, 长2—4毫米, 具亮栗褐色糙伏毛, 边缘具长睫毛; 花冠狭漏斗形, 长3.5—4厘米, 洋红色至深红色, 花冠管长1.8—2厘米, 向基部狭窄, 5裂, 裂片卵形或长卵形; 雄蕊10, 不等长, 比花冠短, 花丝线形, 中部以下被微柔毛, 花药卵形, 长2毫米; 子房卵球形, 长3毫米, 密被栗褐色刚毛状糙伏毛, 花柱比雄蕊长, 微伸出花冠外, 近基部有少许糙伏毛, 柱头褐色, 头状。蒴果长圆柱形, 长6—8毫米, 具刚毛状糙伏毛。花期4月, 果期不详。

特产我国台湾北部。生于山地丘陵。模式标本采自台湾省台北。

本种与皋月杜鹃 *R. indicum* (Linn.) Sweet 相近, 但不同在于后者的叶较小; 花通常1朵, 雄蕊5, 花柱粗壮而光滑, 易于区别。

279. 薄片杜鹃 (华南杜鹃花志)

*Rhododendron tenuilaminare* Tam, Survey Rhodod. South China 48, 102. f. 25. 1983.



图版 123 1—5. 台红毛杜鹃 *Rhododendron rubropilosum* Hayata: 1. 花枝; 2. 花放大; 3. 雄蕊; 4. 雌蕊; 5. 果实。6—9. 台北杜鹃 *Rhododendron kanehirai* Wils.: 6. 花枝; 7, 8. 雄蕊; 9. 雌蕊。10—14. 海南杜鹃 *Rhododendron hainanense* Merr.: 10. 花枝; 11, 12. 雄蕊; 13. 雌蕊; 14. 果实。(李 健绘)