

小灌木，高 1—3 米；分枝多，幼枝直立，纤细，淡紫褐色，密被棕褐色扁平糙伏毛；老枝灰褐色，无毛。叶近于革质，集生枝顶，线状披针形至狭披针形，长 2—4 厘米，宽 3—11 毫米，先端锐尖，具短尖头，基部楔形，边缘微反卷，浅波状，上面深绿色，近于无毛，下面淡绿色，散生淡黄棕色糙伏毛，叶脉在上面凹陷，在下面凸出；叶柄长 3—6 毫米，被棕褐色糙伏毛。花芽长卵圆形，鳞片卵形，外面沿中脊至顶端被亮棕褐色毛。花 1—3 朵顶生；花梗长 5—8 毫米，密被棕褐色糙伏毛；花萼 5 裂，裂片不等大，长卵形，先端圆或渐尖，外面及边缘被长柔毛；花冠漏斗形，长 3.5—4.5 厘米，红色，花冠管筒状，长 1.8 厘米，两面均无毛，5 深裂，裂片开展，倒卵形，顶端圆形；雄蕊 10，不等长，长者伸出花冠外，花丝线形，中部以下被微柔毛，花药卵形，淡黄色；子房卵球形，密被淡黄棕色刚毛状糙伏毛，花柱比雄蕊长，无毛。蒴果卵球形，长 8—10 毫米，几无毛。花期 10—12（—1）月，为本属开花期最晚的种，果期为翌年 5—8 月。

产海南和广西南部。生于海拔 300—500（—1 240）米的山地、林缘或溪边。模式标本采自海南。

本种与产台湾的那克哈杜鹃 *R. nakaharai* Hayata 相近似，但不同在于后者的叶常为椭圆形，长不足 1 厘米，下面被长硬毛；又同台北杜鹃 *R. kanehirai* Wils. 相似，但后者的叶缘具不明显的圆齿状细锯齿；花柱基部被长柔毛，易于区别。

283. 长鳞芽杜鹃（中国植物学会杂志） 大屯杜鹃、大屯满山红（台湾植物志）

Rhododendron longiperulatum Hayata, in *Icon. Pl. Form.* 3: 138. 1913; *Kanehirai*, *Form. Trees*, 319. f. 13. 1917; *Komatsu* in *Tokyo Bot. Mag.* 32: 14. 1918; *Wils.* in *Journ. Arn. Arb.* 6: 183. 1925; *Rehd.* in *Stevenson, Spec. Rhodod.* 88. 1930; *Fang* in *Journ. Bot. Soc. China* 2(2): 610. 1935; 台湾植物志 4: 30. 1978.

小灌木；枝密集，纤细，密被栗褐色糙伏毛。叶纸质，变化大，卵形至卵状长圆形或长圆披针形，长 1.3—2.5 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，先端短渐尖至锐尖，基部楔形，边缘全缘，反卷，上面深绿色，下面淡绿色，两面散生糙伏毛，中脉和侧脉在上面下凹，下面中脉稍凸起，细脉网状；叶柄长 2 毫米，被褐色糙伏毛。花芽卵球形，具数枚鳞片，鳞片外面沿中脊疏被糙伏毛，边缘被微柔毛。伞形花序顶生，有花 2—3 朵；花梗长约 1.3 厘米，密被亮红褐色糙伏毛；花萼 5 裂，裂片三角状卵形，长 2.5 毫米，宽 1.5 毫米，密被淡红褐色长糙伏毛；花冠漏斗状钟形，红色，长约 3 厘米，5 深裂，裂片长圆形，长 1 厘米，顶端钝圆；雄蕊 10，不等长，最长者略短于花冠，花丝扁平，基部微被疏柔毛，花药黑色，近于卵形，长约 2 毫米；子房圆柱状卵球形，长达 3 毫米，密被淡红褐色糙伏毛，花柱线形，无毛。蒴果圆柱状卵球形，长 8—15 毫米，被糙伏毛。花期 3—4 月。

产我国台湾北部。生于海拔 700—1 000 米的草地。模式标本采自台北。

本种与台北杜鹃 *R. kanehirai* Wils. 相近，但不同在于后者的叶较大而狭窄；花较大，花柱基部被少许糙伏毛，易于区别。