

284. 那克哈杜鹃 (中国植物学会杂志) 中原氏杜鹃 (台湾植物志)

Rhododendron nakaharai Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo 25(19): 153. 1908 (Fl. Mont. Form.); Komatsu in Bot. Mag. Tokyo 32: 14. 1918; Wils. in Wils. et Rehd., Monog. Azal. 54. 1921 et in Journ. Arn. Arb. 6: 183. 1925; Rehd. in Stevenson, Spec. Rhodod. 93. 1930; Fang in Journ. Bot. Soc. China 2(2): 608. 1935; 台湾植物志 4: 31. 1978. — *R. serpylli folium* Hayata in Tokyo Bot. Mag. 20: 72. 1906. non. Miquel.

平卧矮灌木; 小枝密集, 刚硬, 密被亮褐色扁平糙伏毛。叶集生枝端, 纸质, 卵形至长圆形或倒披针形至阔椭圆形, 长 0.6—1.2 厘米, 宽 0.5—1.2 厘米, 先端钝, 具短尖头, 基部渐狭窄, 边缘微反卷, 全缘, 上面深绿色, 下面淡白色, 两面密被糠皮状扁平糙伏毛; 叶柄长约 2 毫米, 密被糠皮状扁平糙伏毛。花 1—3 朵簇生枝顶; 花梗直立, 长约 1 厘米, 密被长糙伏毛; 花萼膜质, 5 裂, 裂片阔椭圆形至卵形, 长 2 毫米, 边缘被褐色长糙伏毛; 花冠漏斗状钟形, 鲜红色, 长约 3.5 厘米, 直径 4 厘米, 深 5 裂, 裂至中部, 裂片倒卵状浑圆形, 花冠管内面基部具长柔毛; 雄蕊 10, 长约为花冠之半, 花丝近基部被长柔毛, 花药长圆形, 长 2 毫米, 黑色; 子房圆锥形, 长约 2 毫米, 密被短柔毛, 花柱无毛。蒴果圆球形或近于卵球形, 长约 8 毫米, 被短柔毛。花期 6 月。

产我国台湾北部。生于海拔 700—1 000 米的草丛中。模式标本采自台北。

本种未见标本, 是根据现有的文献资料记载整理的, 待后见到标本时进行补充。

285. 砖红杜鹃 (中国高等植物图鉴) 河哈蒙杜鹃 (中国植物学会杂志), 金毛杜鹃 (台湾植物志) 图版 124: 7—11

Rhododendron oldhamii Maxim., in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Ser. 7. 16(9): 34. (Rhodod. As. Or.) 1870; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 28. 1889; Matsum. et Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo 22: 218. 1906 (Enum. Pl. Form.); Komatsu in Bot. Mag. Tokyo 32: 11. 1918; Wils. in Wils. et Rehd. Monog. Azal. 66. 1921; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 6: 185. 1925 et in Stevenson, Spec. Rhodod. 96. 1930; Fang in Journ. Bot. Soc. China 2(2): 618. 1935; 中国高等植物图鉴 3: 154. 图 4261. 1974; 台湾植物志 4: 32. 1978. — *Azalea oldhamii* Hort. Veitch. apud Masters in Gard. Chron. n. ser. 17: 524. 1882. — *R. oldhamii* Maxim. var. *glandulosum* Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo 25(19): 153. 1908 (Fl. Mont. Form.).

半常绿灌木, 高达 3 米; 分枝繁多, 小枝被开展红褐色扁平腺毛及微柔毛。叶薄革质, 椭圆形或椭圆状披针形, 长 2—7.8 厘米, 宽 1.5—5 厘米, 先端钝尖, 具短尖头, 基部宽楔形至圆形, 边缘微反卷, 具睫毛, 上面干后深褐色, 初时密被棕褐色短刚毛, 后近于无毛, 中脉和侧脉在上面下凹, 下面显著凸起, 密被亮棕褐色腺头短刚毛和稀疏的扁平毛; 叶柄长 4—6 毫米, 密被棕褐色腺状短刚毛及扁平毛。花芽卵球形, 鳞片长卵形, 沿