

本种同砖红杜鹃 *R. oldhamii* Maxim. 相似, 但不同在于后者的枝具腺状短柔毛和较大的花相区别; 又与溪畔杜鹃 *R. rivulare* Hand.-Mazz. 相似, 但后者的雄蕊 5; 枝被腺毛相区别。

294. 美艳杜鹃 (植物分类学报) 寡婆子树 (广西) 图版 125: 6—10

*Rhododendron pulchroides* Chun et Fang in Act. Phytotax. Sin. 6: 164. et 171. Pl. 42: 1. 1957; 华南杜鹃花志 40. 1983.

落叶小灌木, 高约 1 米; 小枝短而纤细, 褐色, 被淡黄棕色皱曲长柔毛; 老枝淡黄棕色或灰褐色, 近于无毛。叶膜质, 假轮生状, 集生枝顶, 长圆形或倒披针状椭圆形, 通常长 1.5—2.5 厘米, 宽 5—9 毫米, 先端短钝尖, 具硬的细尖头, 基部宽楔形至近于圆形, 边缘被淡黄棕色皱曲长柔毛, 上面深绿色, 干后黄绿色, 下面淡绿色, 两面密被淡黄棕色皱曲长柔毛, 尤其在上面残留的毛基致使叶面粗糙, 中脉在上面凹陷, 下面凸出, 侧脉和细脉在两面不明显; 叶柄扁平, 扭曲, 长 2 毫米, 被皱曲长柔毛。花芽宿存, 鳞片椭圆状阔卵形, 外面沿中部至顶端密被淡黄棕色皱曲长柔毛。伞形花序顶生, 有花 1—4 朵; 花梗长约 1 厘米, 密被皱曲柔毛; 花萼 5 裂, 裂片椭圆状长卵形, 长 3.5 毫米, 宽 2 毫米, 顶端钝尖, 基部截平, 边缘具裂片状锯齿, 外面被皱曲柔毛; 花冠紫色, 漏斗状钟形, 长 2.5—3 厘米, 无毛, 裂片 5, 倒卵形, 长 1.5 厘米; 雄蕊 10, 不等长, 最长达 3.2 厘米, 显著伸出花冠外, 花丝线形, 中部以下被微柔毛, 花药紫色; 子房椭圆状长椭圆形, 密被皱曲长柔毛, 花柱长 4 厘米, 丝状, 无毛, 柱头浅裂。果未见。 花期 6 月。

产广西北部。生于海拔 1000 米的河旁、岩石疏阴处。模式标本采自广西龙胜 (平水乡桃善村红滩笔架山)。


本种特多的淡黄棕色皱曲长柔毛, 叶大小不等, 假轮生状; 萼片具少数粗大牙齿; 雄蕊显著伸出花冠之外, 在本组中是特殊的, 可能与锦绣杜鹃 *R. pulchrum* Sweet 有密切的亲缘关系。

本种自 1955 年 6 月 12 日采到标本以后未发现再次采到标本, 只能根据原种标本描述。但模式标本上贴的采集记录有误, 如海拔 850 米; 乔木, 高 4 米; 花粉红色, 1955 年 4 月 13 日, 均与原始文献不同。但标本确是该种的标本。

295. 背绒杜鹃 (植物研究) 图版 126: 4—6

*Rhododendron hypoblematosum* Tam in Bull. Bot. Res. 2(1): 90. f. 2. 1982, 华南杜鹃花志 48. 图 26. 1983.

灌木, 高 1—2 米; 枝圆柱形, 直立或下垂, 灰褐色, 被糙伏毛。叶革质, 散生, 卵形或椭圆状卵形, 通常长 1.8—2 厘米, 宽约 8 毫米, 先端渐尖, 具短尖头或凸尖, 基部宽楔形, 边缘明显地反卷, 上面微粗糙, 疏生长柔毛状糙伏毛, 下面被一层平贴的绵毛和锈色糙伏毛, 中脉在上面下凹, 下面凸出, 侧脉约 4 对, 在上面隐约可见, 下面不明显; 叶柄长约 3—4 毫米, 密被糙伏毛。花芽卵形, 鳞片阔卵形, 长 6 毫米, 宽 4 毫米, 先端微凹, 边缘具腺状睫毛, 外面散生糙伏毛。伞形花序顶生, 具花 3—4 朵; 花梗长 6 毫



图版 125 1—5. 白花杜鹃 *Rhododendron mucronatum* (Bl.) G. Don: 1. 花枝; 2. 萼片; 3. 花剖面; 4. 雄蕊; 5. 雌蕊。6—10. 美艳杜鹃 *Rhododendron pulchroides* Chun et Fang: 6. 花枝; 7. 萼片; 8. 花的剖面; 9. 雄蕊; 10. 雌蕊。11—15. 涧上杜鹃 *Rhododendron subflumineum* Tam: 11. 花枝; 12. 萼片; 13. 花的剖面; 14. 雄蕊; 15. 雌蕊。(吕发强绘)